

이노콜파워정

【원료약품의 분량】 1정(473mg) 중

유효성분	
아세트아미노펜(KP)	325mg
수도에메드린염화물(KP)	30mg
덱스트로메토르판브로마소산염수화물(KP)	15mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg
기타첨가제	
카르복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필셀룰로스, 전분,폴리콜산나트륨, 경질수주규산, 텔크, 미결정셀룰로스	

【성 상】 흰색의 정방형 정제

【효능 및 효과】 감기의 증상(여러 증상)(코막, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 오한(출고 및 리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 · 용량】 성인(만 15세 이상) : 1회 1정, 1일 3회, 식후 30분 복용

【포 장 단 위】 10정 / 상자 (10정 / PTP x 1)

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 증후군(급성 전신성 발진성 고혈압증후군(AGER), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증후군(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자를 주의깊게 알고, 이 약 복용 후 피부발진이 다른 해열진통제와 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니 되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.
- 4) 수도에메드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 증후군(AGER)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의 사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 현상을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(영아)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항장성병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 복용을 복용하지 말 것.

전해염제, 다량 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 구강제, 알미약, 알레르기약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(영아) 및 만 15세 미만의 어린이(어린이나 구두를 사용하면 행동의 변화가 있다.면, 드물지만 심각한 질병인 레이중증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
- 2) 수도에메드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통,

음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 재질을 갖고 있는 사람.

- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨관 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나 위장, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람.

출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 되는 재발되는 기침, 만성기침, 발진, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

- 10) 덱스트로메토르판 분해효소 CYP2D6 저대사자(poor metabolizer)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 상담 시 가능한 이 첨부문서를 지니 약국.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우.
발진, 발진, 가려움, 구역, 두드러기, 식욕부진, 변비, 부종, 배뇨관, 목마름(자식적이지 않나), 아지러움, 불면, 떨림, 불면(원인상과)(뇌졸중), 감각이상, 신장기능장애, 허혈성 대장염(급성 복통, 출혈 등).
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(신장손상) 증상이 나타난 경우
① 속(아비탈)사기 : 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함과 함께 안색이 창백하고, 소변이 적고, 식욕부진, 숨이 차고(관한) 또는 나타날 수 있다.
② 피부발진인 증후군(스티븐스-존슨증후군), 중증독성피부과사용(중증독성) : 고열을 동반하고, 발진 발생(출혈이 포함), 화상과 같이 물집이 생기 는 등의 심각한 증상이 나타날 수 있다.
③ 천식
④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있다.
⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항.

- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지켜 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용에는 주의하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 출혈이 있는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할것.
- 5) 바르릴계 약물, 산한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력에 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
- 6) 과량투여 시 간손상을 일으킬 수 있으므로 명백한 증상이나 징후가 없더라도 신중한 의학적 처치를 받아야 한다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장 방법】 일폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용 기간】 제조일로부터 36개월

【제 조 자】 한국신텍스제약(주) / 잔라복도 약산사 삼기면 산단오로길 106

【소비자상담실】 063-853-8110

※ 본 약의약품은 엄격한 품질관리를 받을 것입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색, 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 자세한 내용은 식품의약품안전처 약물관리정보시스템(<https://ndrug.mfds.go.kr/>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품의 정당한 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.



한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARM CO., LTD.



개정일 20221104