

베인톨정 (미세정제플라보노이드분획물)

■ 원료약품 및 분량: 1정 중

- 유효성분: 미세정제플라보노이드분획물(별규) - 500.0mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호 알루미늄레이크, 황색4호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 톱실드주황색(110361), 톱실드흰색(11W375), 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성상: 주황색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

- 1) 정맥염파부전: 하지부종, 통증, 초기육창 2) 치질

■ 용법 · 용량

1. 정맥질환에는 1일 2회, 1회 1정을 아침, 저녁 식사시 복용한다.
2. 급성치질에는 처음 4일간은 1일 2회, 1회 3정을, 이후 3일간은 1일 2회, 1회 2정을 아침, 저녁에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약물 복용(사용)하지 말 것.

주성분(유효성분)과 첨가제에 대해 과민반응을 가지고 있는 환자

2. 이 약물 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 모유 수유: 활성 물질/대사 산물이 모유로 분비되는지에 대해 알려져 있지 않고, 신생아/영아에 대한 위험성 또한 배제할 수 없다. 수유부 투약여부 또는 수유 중단여부 결정은 수유의 유익성과 수유부 치료의 유익성을 고려하여 결정되어야 한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약물 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 임신부에게 미세정제플라보노이드분획물을 사용한 연구는 없거나 제한적이다. 동물시험에서 생식독성은 나타나지 않았다. 예방 차원에서 임신 중에 사용을 피하는 것이 바람직하다.
- 2) 기임력: 동물을 이용한 생식독성시험에서 수태능(임신능력)에의 영향은 없었다.
- 3) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

이상반응 발현(드러내 보임)빈도는 매우 흔하게($\geq 1/10$);



일반의약품
분류번호: 02150

Baintol Tab.

10mm

흔하게($\geq 1/100$, $\langle 1/10$); 때때로($\geq 1/1,000$, $\langle 1/100$); 드물게($\geq 1/10,000$, $\langle 1/1,000$); 매우 드물게($\geq 1/10,000$, $\langle 1/10,000$), 빈도 불명(활용한 정보로부터 추산이 불가능함)로 구분하였다.

(1) 신경계: 드물게 현기증, 두통, 권태감이 나타날 수 있다 (2) 위장관계: 흔하게 설사, 소화불량, 오심, 구토가 나타날 수 있고 때때로 대장염이 나타날 수 있으며, 빈도 불명으로 복통이 나타날 수 있다. (3) 피부 및 피부파괴(피부미)조작: 드물게 발진, 가려움, 두드러기가 나타날 수 있고, 빈도 불명으로 얼굴, 입술, 눈꺼풀의 부종, 예외적으로 칸케부종이 나타날 수 있다.

4) 급성 치질에 이 약의 대증적(증상에 대응하여) 치료는 다른 항문 증상의 치료를 방해하지 않는다. 치료는 단계적으로 이루어져야 하고, 증상이 신속히 진정되지 않으면, 체계적인 검사가 행해져야 하고 치료가 저검토 되어야 한다. 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 약물상호작용에 관한 연구는 수행되지 않았지만, 현재까지 시판 후 조사에서 임상적으로 약물상호작용을 보이는 약물은 보고되지 않았다.
- 2) 과량투여: 이 약의 과량 투여 사례는 제한적이거나 빈번하게 보고된 부작용은 위장관 증상(설사, 오심, 복통)과 피부 증상(소양증, 발진 등)이 있다. 과량투여시, 대증요법(증상치료)을 사용해야 한다. 3) 운전 및 기계 조작에의 영향: 이 약의 운전 및 기계 조작에의 영향에 관한 연구는 수행되지 않았지만, 이 약의 전반적 안전성 정보를 감안할 때, 이 약의 운전 및 기계 조작에의 영향은 없거나 무시할 만하다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 대로(습기가 적고) 서늘한 곳에 보관할 것 3) 약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(잘못 사용) 따른 사고 발생이나 약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

■ 저장방법: 기밀용기, 실온($1\sim 30^{\circ}\text{C}$) 보관 ■ 사용기간: 제조일로부터 36개월

■ 제조자: 태극제약(주) 경기도 화성시 함남읍 제약공단3길 123

■ 제조의뢰자: (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41 소비자상담전화 070-4346-1213

※ 이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 사용 전 반드시 확인할 것.

※ 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 참조.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 한국약품안전관리원 1644-6223, 14-3330

제조번호:

사용기한:
(연.월.일)



(01)08806625003639

재활용 어려움



HDPE
뚜껑: OTHER
라벨: 종이