

유산균 복합 처방으로 효과 빠른

일반의약품

락토스탑정

복합지사제

✓ 설사 ✓ 체함
✓ 묽은변 ✓ 토사

10정

[소비자 상담전화] 080-302-3000(수신자 부담)

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청

한국의약품안전관리원(1644-6223),

피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)

의약품정보참조 <https://nedrug.mfds.go.kr>

[제조사]

(주)노바랩헬스케어 경북 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

[제조유통 및 판매자]

초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별랑로 381

문서개정년월일 2023.01.16



(01)08060707020813

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하십시오.

[유효성분] 1정(470mg) 중

· 비스무트차질산염(KP) 100.0mg
· 스코폴리아민스(KP) 5.0mg
· 아크리놀수화물(KP) 10.0mg
· 베르베린수화물수화물(KP) 20.0mg
· 락토비실러스스포로게니시스균(생균)활성물질총량 : 1.0x10⁸개 이상 5.0mg

[효능·효과]

설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

[용법·용량]

· 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2만 7세 이하의 어린이
3) 이 약은 유효성을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. : 위장진통-진경제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. ➡

1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고열자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
3) 위-십이지장 궤양이 있는 환자
4) 다른 약을 복용하고 있는 사람
5) 이 약은 항콜린성 약물과 함께 복용하면 부작용이 발생할 수 있으므로 이 성분은 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 이 약이 처방문을 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우
2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우
3) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 복용 시에는 음주하지 말 것. 3) 열이 있을 때 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 밀봉 상태인 합스(가)를 개봉한 후에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기(예) 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃) [포장단위] 10정/PTP

[사용기한] 포장제 옆면 표시일까지 [성상] 노란색의 원형 필름코팅정

[참가제]

· 동물유래성분 : 유당수화물(동물유래:소, 사용부위:우유) · 타르색소 : 황색4호
· 기타첨가제 : 마찰정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분, 글리콜산나트륨, 크로스비셀로오스나트륨, 말트, 폴리메틸렌글리콜6000, 하드록시프로필셀룰로오스, 히포프로멜로오스

※본 제형은 양적한 품질관리를 위한 제형입니다. 만약 구입 시 사용(유통)기간이 경과되었거나 변형, 변색 또는 오손된 제형이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ※사용(유통)기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.