

유헌세티리진정

(세티리진염산염)

MG435220/01
일반의약품

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분
세티리진염산염(EP) ----- 10 mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제: 마이크로셀락100, 크로스카멜로오스나트륨, 폴로이드성아산화규소, 스테아르산마그네슘, 탭실드헥센(29W925)

[성상] 흰색의 장방형 필름코팅정

앞면	뒷면	측면
		

[효능·효과]

- 계절성 및 다년성 알레르기성 비염(코염), 알레르기성 결막염, 만성 특발성(원인불명의) 두드러기, 피부가려움증
- 습진, 피부염(하이드로코티손 외용제와 병용(함께복용(사용)))

[용법·용량]

- 성인 및 6세 이상의 소아: 세티리진염산염으로서 1일 1회 10mg 취침 전에 경구 투여합니다(복용합니다).
- 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 분할 투여합니다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.
- 신장에(신장(콩팥)장애) 환자: 투여 간격은 환자의 신(콩팥)기능에 따라 조절되어야 합니다. 다음 표를 참조하여 용량을 조절합니다. 이 용량 표를 사용하기 위해서는 mL/min 단위의 크레아티닌 청소율 (CLcr)이 필요합니다. CLcr (mL/min)은 다음 공식을 이용하여 혈청 크레아티닌 (mg/dL) 측정치로부터 계산됩니다:

CLcr=	[140 - 연령 (세)] × 체중 (kg)	(여성인 경우 × 0.85)
	72 × 혈청 크레아티닌 (mg/dL)	

신(콩팥)기능이 손상된 성인 환자에 대한 용량 조절

구분	크레아티닌 청소율 (mL/min)	용량 및 빈도
정상	≥80	1일 1회, 10 mg
경증	50 - 79	1일 1회, 10 mg
중등도	30 - 49	1일 1회, 5 mg
중증	<30	매 2일마다 1회, 5 mg
말기 단계의 신 질환을 가진 투석 중인 환자	<10	금기

신장에(신장(콩팥)장애)를 가진 소아 환자는 환자의 신(콩팥) 청소율과 체중을 고려하여 개별적으로 용량을 조절해야 합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.
 - 이 약 및 히드록시진 또는 피페라진 유도체에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 신(콩팥)부전 환자 (크레아티닌 청소율 < 10mL/min)
 - 6세 미만의 유아
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
 - 데오필린 (1일 1회, 400 mg)과 세티리진의 다화 투여 연구에서 데오필린의 약물동태는 세티리진과 함께 투여시 변화되지 않은 반면, 세티리진의 청소율은 약간 (16 %) 감소하였습니다.
 - 리토나비어 (600 mg, 1일 2회)와 세티리진 (1일 10 mg)의 다화 투여 연구에서, 리토나비어의 분해는 세티리진과 함께 투여시 약간 변화 (-11 %)된 반면, 세티리진에 대한 노출 정도는 약 40 % 증가하였습니다.
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
 - 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 함께 투여하지 않습니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 신장에(신장(콩팥)장애) 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다)
 - 간장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다)
 - 노인(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다)
이 약은 주로 신장(콩팥)을 통해 배설되므로 일반적으로 신(콩팥)기능이 저하되어 있는 노인에서는 혈중 농도 과다상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량(줄임)하거나 복용중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 뇌전증 환자 및 발작 위험성이 있는 환자
 - 이 약은 소변고임의 위험을 증가시킬 수 있으므로 소변고임의 선행요인(예: 척수 병변(병에 의한 몸의 변화), 전립선(전립선) 비대증)이 있는 환자에게 사용시 주의하여야 합니다.
 - 임부
임부를 대상으로 수집한 약 700건의 전향적인 자료에서 세티리진의 기형 또는 태아/신생아 독성에 대한 명확한 근거는 보고되지 않았습니다. 동물 시험에서 임신, 배아/태아 발달, 분만 또는 출생 후 발달과 관련하여 직간접적으로 유해한 영향을 나타내지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 임부 투여 시 주의가 필요합니다.
 - 수유부
이 약은 투여 후 생분류 시간에 따라 혈장에서 측정된 농도의 25% ~ 90%가 모유로 분비됩니다. 이 약과 연관된 이상반응이 모유를 먹는 영아(갓난아기)에서 관찰될 수 있으므로, 모유 수유 중인 여성이 이 약을 복용 시 주의가 필요합니다.
 - 수태능(임신능력)에 대한 자료는 제한적이지만 안전성에 대한 우려는 확인되지 않았습니다. 동물 자료는 사람의 생식에 대한 안전성 우려를 보여주지 않습니다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 철부문을서를 소지하십시오.
 - 과량투여시의 증상 및 처치
- 증상: 세티리진의 과량 투여 후에 관찰된 증상들은 주로 중추신경계 영향 또는 항콜린성 효과로 여겨지는 영향과 관련되어 있습니다. 1일 권장용량의 최소 5배를 복용한 후에 보고된 이상반응은 다음과 같습니다: 혼돈, 설사, 어지러움, 피로, 두통, 권태감, 동공확대, 가려움증, 초조, 진정, 졸림, 혼미, 배설장애, 떨림 및 소변고임.
- 처치: 세티리진에 대한 특별한 해독제는 알려져 있지 않습니다. 만일 본 약물을 과량 투여한 경우에는, 증상에 따른 치료 또는 보조 치료가 권장됩니다. 복용한 지 얼마 되지 않은 경우에는 위 세척을 고려해야 합니다.
세티리진은 투석에 의해 효과적으로 제거되지 않습니다.
 - 전신신장계: 졸음, 두통, 때때로 권태감, 마비감, 무력증, 초조, 감각이상, 드물게 가렵고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 머리무거움, 흥분, 경련, 운동이상, 근육강직이상, 실신, 떨림, 공격성, 혼돈, 우울, 환각, 불면증, 틱 장애, 기억상실, 기억장애, 자살관념, 야동이 나타날 수 있습니다.
 - 소화기계: 때때로 목마름, 입술건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통(배아픔), 위통, 복부(배부름)불쾌감, 설사, 드물게 구토, 위장장애, 입술열, 미각이상, 식욕증진이 나타날 수 있습니다.
 - 순환기계: 드물게 빠른맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 두근거림이 나타날 수 있습니다.
 - 혈액: 혈관염, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 드물게 단구 증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있습니다. 또한 드물게 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 합니다.
 - 면역계, 피부 및 피부(피부)조직: 광과민증, 드물게 과민증 및 과민성 쇼크, 때때로 부기, 가려움, 발진, 드물게 두드러기, 혈관신경성부종(부기), 고정약물발진, 급성 전신 발진농포(고름물집)증이 나타날 수 있습니다.
 - 눈: 드물게 흐린 시력, 결막충혈, 안조절 장애, 전후축의 안구운동(oculogyration)이 나타날 수 있습니다.
 - 귀 및 미로: 현기증(어지러움)
 - 간: 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ-GTP, LDH의 상승 등 간기능 장애(초기증상: 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달, 간염이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 신장(콩팥): 때때로 BUN 상승, 당뇨, 파색인 소변, 드물게 배뇨(소변을) 곤란, 야뇨증, 소변고임이 나타날 수 있습니다.
 - 근골격계 및 결합조직 장애: 관절통
 - 기타: 인두염, 기침, 코피, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 가슴통증, 드물게 월경불순, 귀울림, 비염(코염), 체중 증가가 나타날 수 있습니다.
 - 세티리진 투여 중단 후, 일부 환자에서 가려움증 및/또는 두드러기가 보고되었습니다.
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 이 약은 알레르기항원피내반응을 억제하므로 알레르기항원피내반응검사를 실시하기 3 ~ 5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
 - 건강한 자원자에게 1일 20 ~ 25 mg를 투여한 결과, 민감성이나 반응시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나 기계조작 시에는 용량을 초과하지 않습니다. 라세미제(광학이성질체)가 알코올의 영향을 증가시키지 않을 것으로 보여지나(0.5 g/L 혈액 수준), 알코올 또는 기타 CNS 억제제를 병용(함께 복용(사용))투여하면 경계심이 추가될 감소될 수 있고 수행 장애를 야기할 수 있습니다.
 - 증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있습니다.
 - 세티리진의 흡수 속도는 음식물에 의해 1시간 정도 감소되지만, 흡수 정도는 감소되지 않습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 잘못된 사용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 외부포장에 표기

- ※ 블리스터 포장의 제조번호(사용기한 표시방법은 아래와 같습니다.
예) 제조번호: #22001, 사용기한 2025년 1월 6일인 경우 → *22001/250106*로 표시

[포장단위] 10정/상자(10정/PTP X 1), 30정/상자(10정/PTP X 3)

- ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2022년 11월 3일



제조·판매자

유헌양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74

공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr

소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)