

비아콘 정 1000정



- 제조의뢰자: (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55
- <https://www.ilhwa.co.kr>
- 제조자: ㈜노비앰헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 자식산업로 16-53

일반의약품 [천로약품 및 분량 : 1정(300mg(리튬) 중)]

■ 유효성분:

- 니코틴아미드(NP)~25mg
- 리보플라빈(P)~9mg
- 시아노코발린 1000μ(NP)~1mg
- 아스코르빈산(P)~50mg
- 타이민산염(P)~6mg
- 판토텐산칼슘(P)~5mg
- 파리독신염산염(P)~1mg
- 첨가제(동물유래 성분): 유당수화물(간경화 소의 주의)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카멜로오시나트륨, 탈칼드 갈색 99B2, 히프록셀로오스

【성상】 갈색의 원형 필름코팅정

【효능효과】

다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보충

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후병을 잃는 동안이나 회복 후의 체력저하
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화: 구각염(입괴괴염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회 1~3정을 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)불내효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
레보도파
- 다음과 같은 사람 경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 5) 통풍 환자 또는 신장공핍증이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 묽은 변
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 3) 파리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 4) 물산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 5) 고용량 투여에 의해 소화성 재앙을 촉진시키고 경내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈증(hyperurisaemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 7) 이 약을 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 가타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
 - 3) 각종 요점사이에 혈당의 검출을 방해할 수 있다
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오염물질 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 1000정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【사용유효기간】 제조일로부터 36개월

※ 자세한 품목하기 또는 신고사항은 식품의약품안전처 약약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 약약품등 정보 참조

※ 사용(유효)기한이 지난 약품들은 사용하지 마십시오

※ 본 약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(GMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 또는 손상된 의약품은 약국, 제세지 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ◆ 소비자상담실: 080-388-3333 (수신자부담)

※ 본 약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국의약품안전관리원(www.drugsafer.or.kr) 피해구제 상담(14-3333) 및 의약품 부작용 신고·피해구제 상담(1644-6223)을 통해 피해구제 신청이 가능합니다.

※ 최신의 정보 확인방법: 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 1031550-0472-8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인할 수 있음

※ 제정연월일: 2022년 12월 12일

제조번호:

사용(유효)기한:

35 X 18mm



0440 LF 221200

HDPE
두께: LDPE

