

하루한알

셀레늄·비타민D·아연 복합제

셀디아정

【원료약품 및 그 분량】1정 중

■ 유효성분

아셀렌산나트륨오수화물(EP)	0.666mg
(셀레늄으로서 200 μ g)	
콜레칼시페롤과립(별규)	10.0mg
(비타민D로서 1000IU)	
산화아연(KP)	12.449mg
(아연으로서 10mg)	

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 톱실드린색 (21W002), 포비돈

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D의 보급

- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신(온몸) 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 3) 소화장애, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부위에 나타나)는대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

- 구역, 구토, 설사, 피부염, 담·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(폐부기)

2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

4) 우발적으로 과량복용 한 경우

5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30정/상자(10정/PTP3X)

【제조자】 (주)마더스제약

전라북도 익산시 삼기면 산단오릉길 38 마더스제약 제2공장

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2023.03.03) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2023년 03월 03일

SDA30-2303-00

40년 이상 엄마의 마음으로 여러분의 건강을 지켜온



(주)마더스제약 Since 1974 -
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.