

근육경련 및 혈액순환개선제 투와이스 골드 연질캡슐

【유효성분】1캡슐 중

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 150.78 mg)	250 mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500 IU)	500 mg
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로 14.46 mg)	20 mg
티아민질산염(KP)	35 mg
감마오리자놀(KP)	5 mg

【첨가제】

타르색소 : 적색3호, 적색40호, 청색1호

동물유래성분 : 백납(꿀벌, 밀납), 젤라틴(소, 가축)

기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 정제수, 콩기름, 팜유, 폴리소르베이트80

【성상】 미황색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

○ **비타민 E 및 B1의 보급** - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기

○ **이 약에 함유된 티아민 등의 효능·효과는 다음과 같다.** - 말초형행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) - 각기 - 눈의피로

○ **마그네슘결핍으로 인한 근육경련**

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음 의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자 6) 저단백혈증 환자 7) 임부 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 6) 우발적으로 과량복용 한 경우 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조사】 동방에프티엘(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

【판매원】 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상 받을 수 있습니다.(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품 안전관리원(1644-6223)

동방에프티엘(주) 광동제약(주)