

판시자임정

500정

[원료약품 및 그분량] 1정 중,

- 유효성분: 판크레아틴(KP).....175mg(전분당화력 1654단위 이상, 지방소화력 677단위 이상, 단백소화력 22365단위 이상), 셀룰라제(KP).....50mg(섬유소당화력 60단위 이상), 우담즙 건조엑스(생규).....25mg(콜산(으)로서 11.25밀리그램), 시메티콘(KP).....26mg
- 동물유래성분: 판크레아틴(돼지-췌장), 우담즙 건조엑스(소-담즙)
- 첨가제: • 타르색소: 황색203호, 청색1호 • 동물유래성분: 유당수화물(소-우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산 나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드 녹색319G726, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 연녹색의 타원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만 15세 이상: 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 만 7세 이하의 어린이 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 500정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30°C)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오. ※가장 최근 개정된 제품 설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다. ※제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의 주십시오. ※부작용 피해구제 신청: 한국의약품 안전관리원(1644-6223)

설명서 최종 개정 연월일: 2023.01.30

• 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

• 제조자: (주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

제조·
번호·
사용·
기한·

확인공간: 35X18mm



HDPE
뚜껑: LDPE



8 806534 052711