


유산균 복합 처방으로 제조되었습니다.

KGMP적격업체
일반의약품

유산균복합처방 정장지사제

락토딘프리미엄정



설사 · 묽은변 · 체함 · 토사

10정

【제조외의자】한솔신약(주) / 충북 음성군 금왕읍 청평길 2-11

【제조자】(주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53



8 806458 043611

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】 1정(470.00 mg) 중

비스무트차질산염(KP) ... 100.00mg, 스코폴리아 엑스(KP) ... 5.00mg,
아크리놀수화물(KP) ... 10.00mg, 베르베린염화물수화물(KP) ... 20.00mg,
락토바실루스프로게네스균(별규)(1.0×10^7 개 이상) ... 5.00mg

【성상】 노란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 설사, 복통(배앓음)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유효성을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 위장진통 · 진경제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 사람 →

2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자 3) 위 · 십이지장 궤양 등이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색 4회타르트린을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 복용 시에는 음주하지 말 것. 3) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온($\sim 30^{\circ}\text{C}$)보관

【사용기한】 용기 측면 표시일까지(순서·연·월·일)

【첨가제】

■ 첨가제(착색제): 황색4호 ■ 동물유래성분: 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
■ 기타첨가제: 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 전분글리콜산나트륨, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리메틸렌글리콜6000, 신화티탄, 락트