

관절 건강을 위한 고효량 콘드로이친

비스콘틴800정**【유효성분】** 1정중

콘드로이틴설페이트나트륨(KP).....	800 mg
비스벤티아민(티아민염산염으로서 43.75 mg)(KP).....	50 mg
니코틴산아미드(KP).....	50 mg
피리독신염산염(KP).....	50 mg
판토텐산칼슘(KP).....	15 mg
리보플라빈(KP).....	6 mg
농축콜레칼시페롤 산(비타민D ₃ 로서 1000I.U)(EP).....	10 mg
메코발라민(KP).....	1000 µg
이노시톨(KP).....	25 mg

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급
 - 1) 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
 - 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로
- 다음 증상의 완화
 - 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 19세 이상 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용하십시오.**【사용상의 주의사항】****1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.**

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만3개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 -비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 3) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 -구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 식욕부진, 홍반, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종·수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관**【성상】** 적갈색의 장방형 필름코팅정**【사용기한】** 제조일로부터 36개월**【소비자상담실】** 080-990-8200 / www.yungjin.co.kr**【첨가제】**

유당수화물, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탭솔드갈색(99B703)

【동물유래성분】

콘드로이틴설페이트나트륨(기원:소, 사용부위:연골)

유당수화물(기원:소, 사용부위:우유)

【제조사】

성이바이오(주) / 강원도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층

【판매자】

영진약품(주) / 경기도 화성시 남양읍 무하로66

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 신고 및 피해 구제 상담 : 1644-6223