

에디맥스디정

(탄산칼슘/농축콜레칼시페롤분말)

일반의약품

비타민D 고함량(1,000IU) + 칼슘 100mg

에디맥스디정

(탄산칼슘/농축콜레칼시페롤분말)

EdeetmaxD Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분 : 탄산칼슘(USP) 250mg
 (칼슘(으)로서 100mg)
 농축콜레칼시페롤분말(EP) 10mg
 (콜레칼시페롤(으)로서 1,000IU)

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호

첨가제(동물유래) : 유당수화물 <기원동물 : 소, 사용부위 : 우유>
 콜레칼시페롤 <기원동물 : 양, 사용부위 : 양모>
 젤라틴 <기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽>

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭덱드녹색21G025, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 녹색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정을 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia ; 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염 증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자.
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한증상의 신부전 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 만 1세 미만의 젖먹이
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 심장·순환기계 기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 강심배당체를 투여 중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시(함께 복용시) 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】

30정/병, 90정/병

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.huteks.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인해 주십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎1644-6223, ☎14-3330)
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

제조원: 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99
 제조자: (주)휴텍스 제약 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 106

설명서 작성일 221226

우수의약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체