

[원료의약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염 500mg
- 첨가제(타르색소) : 황색 4호, 황색 5호
- 기타첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 침강탄산칼슘, 크로스 폴리머, 톨크, 스테아르산마그네슘, 오파드라이흰색(03B28796), 오파드라이 AMBII88A130026주황색

[성상] 주황색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과] 기능 무력증의 보조치료

[용법용량]

- 성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1회 3회 복용한다.
- 소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.
- 단, 4주 이상 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
6세 미만의 유아
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 2) 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것
 - 3) 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 42정/병, 84정/병, 180정/병, 500정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조판매원] (주)김스제약 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 106

[제품문의] 02-6357-0077 [홈페이지] www.kimspharma.com

[의약품정보참조] <http://nedrug.mfds.go.kr>

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(14-3330 (상담)) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.