

고혈압 치료제
듀나브정 60/2.5밀리그램
(피마사르탄칼륨/에스암로디핀)

HT-230102

중대한 이상사례 190%(71/3,729명, 총 82건)

이 약과 같이 레닌-안지오텐신계에 직접 작용하는 약물들 일부(임신 제2~3기)에 투여시, 태아 및 신생아 손상 및 사망이 일어날 수 있으므로 이 약 복용하는 동안 임신이 확인된 것은 이 약의 투여를 즉시 중단해야 한다.

(≥ 1/1,000, < 1/100); 드물게(≥ 1/10,000, < 1/1,000); 매우 드물게(< 1/10,000), 빈도 불명(활용한 정보로부터 추산이 불가능함)
 <표> 이 약과 관련된 이상반응⁰

비밀번호	비밀번호	비밀번호
------	------	------

국내에서 새영기를 귀여워하던 송인 3,729명을 대상으로 실시한 이번 우 소자 질과, 이상사태의 발언율은 전국단위와 동일했다. 19.42%인 724/3,729명, 총 1,043건로 보고되었다. 이 중 중대한 이상사태를 발한 빈도에 따라 아래 표에 열거하였으며, 인과관계를

영양·식·결합 질환	피판역	
병·어·기·전 질환	대선포진	
시간 이상 질환	시간이상	
심박 이상 질환	빈맥	
심혈관 질환	혈압상승	혈압상승
심혈관 질환 및 응고 질환	자혈관	
간 및 담도에 질환	지방간	

혈관계: 저혈압, 혈관염

④ 배아유전자
러인 안지오텐신계에 직접적으로 작용하는 약물은 임부에 투여시 태아 또는 신생아에게 병적 상태 및 사망을 일으킬 수
특히 임신 2 주기에 지나 안지오텐신계에 직접 작용하는 약물 투여시 태아 및 신생아에 치명적 신생아 도복과 형성

설명서 작성일 : 230102

제 조 사 : 칠리교제약㈜ 충청북도 신안군 평해천변 풍조2길 2
 성명서 작성일 : 2010.2

설명서 작성일 : 230102