

일반의약품

의약품을 사용하기 전에 이 첨부문서를 주의깊게 읽고
사용(복용)하시고 첨부문서는 의약품과 함께 보관하십시오.

목감기약

화이트벤[®] 쿼플라스 연질캡슐

원료약품 및 그 분량

유효성분 1캡슐(130mg) 중	
아세트아미노펜(USP)	200,000mg
구아이페네신(KP)	41,660mg
덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)	8,000mg
노스카핀염산염수화물(KP)	5,340mg
트리프롤리딘염산염수화물(USP)	0,660mg

기타 첨가제
동물유래성분: 젤라틴(S, 가축)
기타첨가제: 폴리비닐피롤리돈400, 정제수, 프로필렌글리콜, 포비돈, 소르비톨스페셜글리세린비렌드, 치차청색소

성상

미황색(연노랑) 내지 연한 청색의 투명한 내용물을 함유한 청색의 투명한 타원형 연질캡슐

효능효과

감기의 증상(여러 증상)(코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법용량

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용
만 8세 이상~만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조원

(주)알피바이오
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7
경기도 화성시 마도면 청원산1번 5길 60
(1층, 2층일부, 3층일부)

포장단위

10캡슐/상자(10캡슐/PTPX1)

판매원

(주)셀트리온제약
중국 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

사용기간

제조일로부터 36개월

소비자상담실

080-850-3611~2

- 본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 유통과정 중 잘못으로 사용기간이 경과되었거나 제품이 변질, 변색, 오염 및 손상된 경우 구입한 약국을 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상담하세요
- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 의약품을 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- 구입 시 사용기간이 지나거나 변질 · 변색 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국 의약품(1644-6223, 14-3330)에 알리거나 셀트리온제약(080-850-3611~2)으로 연락 바랍니다.
- 부작용 발생 시, 한국 의약품(1644-6223, 14-3330)에 피해구제를 신청할 수 있습니다.
- 본 설명서 개정일 이후의 최신화가사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 셀트리온제약 홈페이지(<http://www.celltrionph.com>)의 제품정보를 참고하시기 바랍니다.

1. 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEF), 스티븐스 - 존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다. 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약(가래약) 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만3개월 미만의 영아(갓난아기)
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염)코염용 경구제, 열미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레임증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장염, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 폐노(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈현상을 가지고 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 동맥경, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 기도한 가래가 동반되는 기침, 주 이상 지속 혹은 재발되는 기침, 만성 기침 발열 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진, 발열, 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 폐노(소변을 누)곤란, 목이부(지속적이거나 심한), 어지러움
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시스): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 소변이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부접촉안증후군(스티븐스-존슨증후군): 중독성표피괴사증후군(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진발적(출혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
③ 천식
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있다.
⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법용량을 잘 지킬 것
- 장기간 계속 복용하지 말 것
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.(어린이의 용법 · 용량이 있는 경우)
- 복용시에는 음주하지 말 것
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
- 바르비탈계 약물, 심한게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.