

징코더블에스정 240밀리그램 (은행업전조엑스)

일반의약품 정보 이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용 전 반드시 첨부문서를 확인할 것 ※ 부작용 보고 및 피해구제신청 : 한국약물안전관리센터(1644-6223)

[원료약품 및 그 분량] 1정(630밀리그램) 중

- 유효성분
은행업전조엑스(생규) 240.00밀리그램
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유)
- 기타 첨가제 : D-만니톨, 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카멜로오스나트륨, 셀룰로스, 탬플드녹색(99G1033)

[성상] 녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능효과] 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증 (동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

[용법용량] 은행업전조엑스로서 1회 240 mg, 1일 1회 1정 복용한다.

식사와 관계없이 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 은행업전조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
- 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
- 3) 임신부
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 항응고제(예: 헤파린, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
- 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다.
- 3) 이 약을 나타내지 않는 혈당 수치와 같은 갑상선기능항진증과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 혈장 수준이 더 높아질 위험이 있다. 경구용 티오펜과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 혈장 수준이 나타날 위험이 있다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
- 2) 수술부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 3) 이 약을 복용(사용)하여 간질 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.

4. 다음과 같은 경우는 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
- 2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.

3) 이상반응

- 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
- 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
- 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다.

장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.

4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증
- 5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당 성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 30 정/상자(10정/PTP*3)

[저장방법] 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[제 조 자]

코스맥스파마㈜ / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

(수행과정 : 원료청량 ~ 포장)

코스맥스파마㈜ / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

(수행과정 : 포장)

[판 매 자]

에이치엘비타라퓨틱스 주식회사 / 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 2201호 (정자동, 파크뷰오피스타워 22층)

[소비자상담실] 070-8634-1317-9 (반문 및 교환처 : 구입처)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. 설명서 작성일자(2023년 06월 21일) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

설명서 문안 작성일 : 2023년 06월 21일