

감기의증상 발열·두통

볼드원 캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(580mg) 중

■ 유효성분: 갈근(KP)	267mg	대추(KP)	133mg
감초(KP)	67mg	마황(KP)	133mg
건강(KP)	33mg	작약(KP)	100mg
육계(KP)	100mg		
	이상 건조엑스로서 79mg		
아세트아미노펜(KP)	160mg	리보플라빈(KP)	2mg
아스코르빈산(KP)	25mg	벤토포타민(KP)	4mg

- 동물유래성분: 유당수화물 (기원: 소, 사용부위: 우유)
- 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호
- 기타첨가제: 옥수수전분, 폴로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성상】 갈색 분말이 충전된 상부 적갈색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】 감기의 증상(여러 증상(인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

보통 성인(만15세 이상) 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함)기억제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토)를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.
- 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 기려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간질질환, 심장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기), 위십이지장궤양, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 속(나비박스): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은 땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막안종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리얼증후군): 고열을 동반하고, 발진 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성발열: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. ⑥ 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 겐조로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) ⑦ 근병증(근육병증): 저칼혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 주의감, 사지경련, 마비 등의 증상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. 3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 4) 혈압이 높은 환자 또는 고령자 5) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자 6) 부종이 있는 환자

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
- 복용 시에는 음주하지 말 것.
- 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
- 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용)) 시 위알도스테론증이나 저칼혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10캡슐/상자(10캡슐/피티팩X1)

【취급상의 주의사항】

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질 변태 또는 오손된 제품 이 발견된 경우에는 구입하신 업체를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 최종승정일자(2023년 1월 31일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 "의약품 검색" 또는 소비자 상담실(080-359-3333)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

【제조자】 정우신약(주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

【제조외지】 원광제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 미륵사지로 795-20