

효과빠른 기침 가래 제거 큐어코프엑스

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

■ 유효성분

데스트로메토르판브로화수소산염수화물(KP).....	7.5밀리그램
트리메토클로롤염산염수화물(KP).....	1밀리그램
구아이페네신(KP).....	37.5밀리그램
클로르페니라민말레산염(KP).....	2밀리그램

■ 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소의 가죽)

■ 기타첨가제 : 락트소, 부분탈수유동소르비톨, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜600, 프로필렌글리콜

【성상】 미황색 또는 옅은 적색의 투명한 액상 내용물이 든 적색의 투명한 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

기침·가래

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐, 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해(기침을그치게함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기용약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 감상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 만 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 10 캡슐/피티피, 20 캡슐/상자(10캡슐/피티피 X 2)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조사】 아이큐어(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 248

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (만약, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 소비자 상담전화(080-700-0178) 또는 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug>)을 통해 확인할 수 있습니다.

※ 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

【신청방법】 ☎1644-6223, 14-3330 | 📧 karp.drugsafe.or.kr

【신청대상】 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

【보상범위】 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

CCHA-2306-01

설명서 작성(개정)연월일 : 2023.06.16

iCure 아이큐어(주)