

자누그립틴듀오엑스알서방정

50/500, 50/1000, 100/1000밀리그램

(사리랑립틴산염·칼슘, 메포프린인산염)

원격의료

1. 효능 및 용량

- **1차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **2차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **3차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **4차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.

2. 부작용

- **1차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.
- **2차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.

3. 주의사항

- **1차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.
- **2차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.

4. 약효

- **1차 약효**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **2차 약효**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.

5. 약성분

- **1차 약성분**
 자누그립틴, 듀오엑스알서방정.
- **2차 약성분**
 자누그립틴, 듀오엑스알서방정.

6. 보관법

- **1차 보관법**
 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- **2차 보관법**
 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

7. 유통기한

- **1차 유통기한**
 제조일로부터 24개월입니다.
- **2차 유통기한**
 제조일로부터 24개월입니다.

8. 기타사항

- **1차 기타사항**
 기타.
- **2차 기타사항**
 기타.

1. 약효

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|------------|--------|---------|----------|
| LDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| TG (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoB (%) | 55 | 65 | 75 |
| Lp(a) (%) | 55 | 65 | 75 |
| HDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoA-I (%) | 55 | 65 | 75 |

2. 부작용

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|-------------|--------|---------|----------|
| 소화기 장애 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 근육통 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 피로 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 두통 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 어지러움 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 구역, 구토 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 설사 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 변비 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 배변 장애 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 방광염 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 비뇨기 장애 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 호흡기 장애 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 심혈관 장애 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 내분비 장애 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 면역 장애 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 감염 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 알레르기 반응 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 기타 (%) | 10 | 15 | 20 |

3. 주의사항

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------|--------|---------|----------|
| 임신 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 수유 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 알코올 섭취 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 담배 흡연 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 기타 약물 복용 (%) | 10 | 15 | 20 |
| 기타 (%) | 10 | 15 | 20 |

4. 약효

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|------------|--------|---------|----------|
| LDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| TG (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoB (%) | 55 | 65 | 75 |
| Lp(a) (%) | 55 | 65 | 75 |
| HDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoA-I (%) | 55 | 65 | 75 |

5. 약성분

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------|--------|---------|----------|
| 자누그립틴 (%) | 50 | 50 | 100 |
| 듀오엑스알서방정 (%) | 500 | 1000 | 1000 |

6. 보관법

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------------|--------|---------|----------|
| 서늘하고 건조한 곳에 보관 (%) | 100 | 100 | 100 |

7. 유통기한

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|-----------------|--------|---------|----------|
| 제조일로부터 24개월 (%) | 100 | 100 | 100 |

8. 기타사항

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------|--------|---------|----------|
| 기타 (%) | 10 | 15 | 20 |

2. 효능 및 용량

- **1차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **2차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **3차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **4차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.

3. 부작용

- **1차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.
- **2차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.

4. 주의사항

- **1차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.
- **2차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.

5. 약효

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|------------|--------|---------|----------|
| LDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| TG (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoB (%) | 55 | 65 | 75 |
| Lp(a) (%) | 55 | 65 | 75 |
| HDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoA-I (%) | 55 | 65 | 75 |

6. 약성분

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------|--------|---------|----------|
| 자누그립틴 (%) | 50 | 50 | 100 |
| 듀오엑스알서방정 (%) | 500 | 1000 | 1000 |

7. 보관법

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------------|--------|---------|----------|
| 서늘하고 건조한 곳에 보관 (%) | 100 | 100 | 100 |

8. 유통기한

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|-----------------|--------|---------|----------|
| 제조일로부터 24개월 (%) | 100 | 100 | 100 |

9. 기타사항

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------|--------|---------|----------|
| 기타 (%) | 10 | 15 | 20 |

3. 효능 및 용량

- **1차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **2차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **3차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **4차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.

4. 부작용

- **1차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.
- **2차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.

5. 주의사항

- **1차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.
- **2차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.

6. 약효

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|------------|--------|---------|----------|
| LDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| TG (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoB (%) | 55 | 65 | 75 |
| Lp(a) (%) | 55 | 65 | 75 |
| HDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoA-I (%) | 55 | 65 | 75 |

7. 약성분

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------|--------|---------|----------|
| 자누그립틴 (%) | 50 | 50 | 100 |
| 듀오엑스알서방정 (%) | 500 | 1000 | 1000 |

8. 보관법

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------------|--------|---------|----------|
| 서늘하고 건조한 곳에 보관 (%) | 100 | 100 | 100 |

9. 유통기한

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|-----------------|--------|---------|----------|
| 제조일로부터 24개월 (%) | 100 | 100 | 100 |

10. 기타사항

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------|--------|---------|----------|
| 기타 (%) | 10 | 15 | 20 |

4. 효능 및 용량

- **1차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **2차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **3차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **4차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.

5. 부작용

- **1차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.
- **2차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.

6. 주의사항

- **1차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.
- **2차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.

7. 약효

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|------------|--------|---------|----------|
| LDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| TG (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoB (%) | 55 | 65 | 75 |
| Lp(a) (%) | 55 | 65 | 75 |
| HDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoA-I (%) | 55 | 65 | 75 |

8. 약성분

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------|--------|---------|----------|
| 자누그립틴 (%) | 50 | 50 | 100 |
| 듀오엑스알서방정 (%) | 500 | 1000 | 1000 |

9. 보관법

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------------|--------|---------|----------|
| 서늘하고 건조한 곳에 보관 (%) | 100 | 100 | 100 |

10. 유통기한

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|-----------------|--------|---------|----------|
| 제조일로부터 24개월 (%) | 100 | 100 | 100 |

11. 기타사항

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------|--------|---------|----------|
| 기타 (%) | 10 | 15 | 20 |

5. 효능 및 용량

- **1차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **2차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **3차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.
- **4차 고지혈증 치료제**
 LDL-C, TG, apoB, Lp(a)를 낮추고 HDL-C, apoA-I를 높여줍니다.

6. 부작용

- **1차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.
- **2차 부작용**
 소화기 장애, 근육통, 피로, 두통, 어지러움, 구역, 구토, 설사, 변비, 배변 장애, 방광염, 비뇨기 장애, 호흡기 장애, 심혈관 장애, 내분비 장애, 면역 장애, 감염, 알레르기 반응, 기타.

7. 주의사항

- **1차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.
- **2차 주의사항**
 임신, 수유, 알코올 섭취, 담배 흡연, 기타 약물 복용, 기타.

8. 약효

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|------------|--------|---------|----------|
| LDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| TG (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoB (%) | 55 | 65 | 75 |
| Lp(a) (%) | 55 | 65 | 75 |
| HDL-C (%) | 55 | 65 | 75 |
| apoA-I (%) | 55 | 65 | 75 |

9. 약성분

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------|--------|---------|----------|
| 자누그립틴 (%) | 50 | 50 | 100 |
| 듀오엑스알서방정 (%) | 500 | 1000 | 1000 |

10. 보관법

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|--------------------|--------|---------|----------|
| 서늘하고 건조한 곳에 보관 (%) | 100 | 100 | 100 |

11. 유통기한

| 항목 | 50/500 | 50/1000 | 100/1000 |
|-----------------|--------|---------|----------|
| 제조일로부터 24개월 (%) | 100 | 100 | 100 |

12. 기타사항