

일반의약품 정보

이 약을 복용하기 전 반드시 아래의 내용을 확인하세요.

[유효성분] 1정 중
트리메부틴말레산염(KP) 200 mg

[효능·효과]

1. 주효능 효과
 ■ 식도역류 및 열공(구멍)헤르니아(탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토) ■ 과민성대장증후군 및 경련성 갈장 ■ 소아 질환 : 습관성 구토, 비강염성 장난동과장애편비, 설사)

[용법·용량]

성인 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg (1정) 1일 3회 식전에 경구투여한다(먹는다).
 연월(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성

(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucoase-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 형색 4회(타르타라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용(이상반응)

■ 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복병(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목 마름), 구내(입안)마비감 등이 나타날 수 있다. ■ 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. ■ 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(머지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다. ■ 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다. ■ 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

4. 임부에 대한 투여

임산중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

5. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고母乳이 투여되는 수유를 중지한다.

[저장방법] ■기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 ■어린이의 손에 닿지 않게 보관하세요. ▼

일반의약품 정보(계속됨)

[사용기한] 케이스 연면 표시일까지(연.월.일(YYYY.MM.DD))

[첨가제] ■첨가제(타르색소) : 황색4호
 ■첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유) ▼

■기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스
 * 본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

위·장관 운동조절제

제이부틴
더블정

(트리메부틴말레산염 200mg)

과민성대장증후군
 소화불량
 식도역류, 구토

10정



일반의약품



"태극제약은 LG생활건강의 자회사입니다"

[성상] 연한 노란색의 원형정제 (앞 : TG 뒤 : JD)
[제조사의지] 태극제약㈜ 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
[제조사] 진양제약㈜ 강원도 원주시 지점면 신령로 34

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 및 QR 코드 참조 작성 연월일 : 2023.02.21
[소비자상담전화] : 080-300-8282]

의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 www.kafda.go.kr 한국의약품안전관리원 | 1644-6223, 14-3330

(01)089036449006514

