

생약성분 두드리기 치료제

지민에스정

두드리기, 습진, 가려움증, 뾰



【원료약품 및 그 분량】 1정(200 mg) 중

■ 유효성분 :

인진호향 건조엑스(10→1)(별규) 53.3 mg, 클로르페니라민말레산염(KP) 4.0 mg
DL-메틸알페드린염산염(KP) 12.0 mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이200분홍색
(200F24013), 크로스포비돈, 폴리비닐피롤리돈6000

【성 상】 분홍색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】 두드리기, 습진, 가려움증, 뾰

【용법·용량】 성인(15세이상) : 1회 1정 1일 3회 식후에 복용(사용)한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 15세 미만의 소아
- 2) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인 (이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 혹은 골반 내 장기의 유출작용에 의해 유조산의 위험이 있다.)
- 3) 수유부 (이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논은 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 않는다.)
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 설사약, 일레르기용약, 항스타틴제제를 함유하는 약에 : 멀미약, 감기약, 진해거담제과는 병용함께 복용(사용)투여 하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 지금까지 일레르기용약, 감기약, 진해거담제, 멀미약 등에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 녹내장에 : 눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨(소변을 보는) 곤란 환자
- 3) 다른 약물을 투여중인 환자
- 4) 허약체질 환자
- 5) 설사, 연변(붉은변)의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있다.)
- 6) 현저하게 위장이 약한 환자
- 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있다.)
- 8) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자 (부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있다.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구갈(목마름), 구역, 구토, 식욕부진, 위부(상복부) 불쾌감, 복통, 설사 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

2) 이 약은 하제성분을 함유하고 있으므로 투여에 의해 묽은 변이 나타날 경우도 있으나 만약 심한복통을 수반하는 설사가 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 이 약은 극약 성분이 함유되어 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 이 약의 투여에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 장기간 계속하여 투여하지 않는다.
- 5) 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의한다.
- 6) 지극성 완화제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 7) 다른 한방제제 등을 병용(함께 복용(사용))하는 경우는 함유 생약의 중복에 주의한다. 대황 함유제제는 병용(함께 복용(사용))투여시 특히 주의한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 10정(10정/PTP)

【제품문의처】 (유)한풍제약 소비자상담실 : 02-521-2618

【제조판매원】 (유)한풍제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층, 봉동로 705

※ 본 의약품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)" 에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 첨부서 작성일자(2023년 02월 28일) 이후에 변경된 내용은 소비자 상담실번호(02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생할 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 제품 개봉시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

제 조  한풍제약

판매원  한풍제약

전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

www.hanpung.co.kr 소비자상담실 02.521.2618

고객상담실 02.521.2618
www.hanpung.co.kr