

활성비타민 함유 고품량 종합영양제

맥스타민 메가맥스정

MAXTAMIN MEGAMAX



【원료약품 및 분량 : 1정 중】 유효성분:

시아노코발라민 1000배산(KP).....	100mg (시아노코발라민(으)로서 100마이크로그램)
폴산(KP).....	0.1mg
리보플라빈(KP).....	100mg
제피아스코르브산(별규).....	104.2mg (아스코르브산(으)로서 101밀리그램)
산화아연(KP).....	31.2mg (아연(으)로서 25밀리그램)
피리독신염산염(KP).....	100mg
니코틴산아미드(KP).....	100mg
판토텐산칼슘(KP).....	100mg (칼슘(으)로서 8.4밀리그램)
벤토포아민(KP).....	100mg (티아민염산염(으)로서 72.3밀리그램)
비오틴(USP).....	0.1mg
콜린타르타르산염(별규).....	100mg
이노시톨(KP).....	100mg
우르소데옥시콜산(KP).....	10mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP).....	80mg (비타민E(으)로서 40아이.유)
감마-오리자놀(KP).....	10mg
콜레칼시페롤농축분말(EP).....	10mg (비타민D(으)로서 1000 아이.유)(동물유래성분 : 양·양모)
산화마그네슘(KP).....	30mg (마그네슘(으)로서 18.1밀리그램)
셀레늄함유건조효모(KP).....	9.23mg (셀레늄(으)로서 4.98마이크로그램)
유비데카레논(KP).....	10mg

동물유래성분 : 콜레칼시페롤농축분말 (양·양모)
기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이백간색(200F650003), 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 적색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로·임신·수유기·병중·병후·발육기·노년기·이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. • 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방 • 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 • 각기 • 눈의피로

○ 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용.

【사용상의주의사항】

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 천신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자

2) 이 약을 복용하는 동안 다음이 약을 복용하지 말 것

	앞	뒤
식별 표시	IHB	

- (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이(비타민 D 또는 칼슘 함유제)
- (4) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- (5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- (6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (7) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (8) 신장장애 환자
- (9) 저단백혈증 환자
- (10) 강심배당체를 투여 중인 환자
- (11) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- (12) 신장결석 병력이 있는 환자
- (13) 임부

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 몹은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관 장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용 할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- (10) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (11) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- (3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- (5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관 【포장방법】 60 정/상자, 120 정/상자([(60정/병×2)])

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36 개월

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)

의약품 등 정보 참조.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣소비자상담실 : 080-388-3333 (수신자부담) ※ 의약품의 정상적인 사용임에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해 구제 신청은 한국의약품 안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.

※ 본 의약품을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 항상 본 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.