

콜드엔정

종합 감기
정

밤까지 편안한 무카페인 감기약 콜드엔 정

콜드엔 정은 작은 크기의 정제로 목넘김이 편한 무카페인 종합감기약입니다.

특 장 점

- ① 무카페인 감기약으로 밤에도 복용 가능합니다.
- ② 정제크기가 작아 목넘김이 편합니다.

주 효능·효과



목살감기



코감기



목감기

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

- 주성분 :
아세트아미노펜(KP) 200mg
슈도에페드린염산염(USP) 15mg
di- 메틸에페드린염산염(KP) 12.5mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP) 8mg
클로르페니라민말레산염(KP) 1.25mg
- 첨가제(타르색소): 청색2호
- 기타첨가제: 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산 마그네슘, 오파드라이 블루(80W40502), 카르나우바넵, 코포비돈, 크로스카멜로스나트륨, 히드록시프로필 셀룰로오스

효능·효과 감기의 증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법·용량 1일 3회 식후 30분, 1회에 다음 용량을 복용하십시오. 만 15세 이상 1회 2정, 만 8세 이상 ~ 만 15세 미만 1회 1정

성 상 하늘색의 원형 필름코팅정



사용상의 주의사항

1. 경고 ① 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. ② 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고열물집증(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SSJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 처하여 환자분들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다. ③ 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다. ④ 슈도에페드린 함유 약품 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 흉만, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 ① 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 ② 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람 ③ 만 3개월 미만의 영아 ④ MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 ⑤ 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분 ⑥ 콩 또는 땅콩에 과민성이 있는 환자분

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것, 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 알미약, 알레르기약)

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. ① 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) ② 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현된 경우 ③ 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 ④ 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 ⑤ 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장질환, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 ⑥ 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 ⑦ 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 ⑧ 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 동맥관협착, 항응고제, 스테로이드 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) ⑨ 다음과 같은 기침이 있는 사람 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 ⑩ 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 산중히 투여해야 하는 환자분

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- ① 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(종혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부정(부기), 배뇨(소변변화)곤란, 목아름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- ② 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한) 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 기승단단함 등과 함께 안색이 창백하고, 소변이 차고, 식욕없, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부점막안종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(종혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다.
⑤ 간질환패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.
- ③ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여 만세 미만에 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
① 정해진 용법·용량을 잘 지켜 ② 정기간 계속 복용하지 말 것. ③ 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것. ④ 복용시에는 음주하지 말 것. ⑤ 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것. ⑥ 바리비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자분에게는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. ⑦ 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자분에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자분이 다른 정수용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하고 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

저장상의 주의사항

- 1 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 10정/상자(10정/PTP)×1

사용기간 제조일로부터 36 개월

- * 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.
- * 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 약품은 공정거래 위원회고(소비자 분쟁해결 기준에 의거, 구입한 약국 및 약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- * 부작용보고 및 피해구제신청: 한국약물관리전관리원(4-3330, 1644-6223)

제조자: (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14



작성 연월일: 2023.02.23

*이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인하실 수 있습니다.