

마그네슘·활성비타민 B₁이 함유된 센스온 액티브업 연질캡슐



[원료약품 및 그분량] 1캡슐 중,

■ 유효성분

산화마그네슘(KP)	350.0mg(마그네슘으로서 211.05mg)	토코페롤아세테이트(KP)	500.0mg(비타민E로서 500I.U)
벤포타이민(KP)	69.0mg(티아민염산염으로서 49.89mg)	피리독신염산염(KP)	50.0mg
리보플라빈(KP)	50.0mg	유비데카렌(KP)	5.0mg
γ-오리자놀(KP)	5.0mg	시아노코발라민(KP)	0.5mg

[첨가제]

■ 동물유래성분 : 속신산젤라틴(소·가축)

■ 타르색소 : 적색40호, 청색1호, 황색5호

■ 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 소르비톨엑(비결정성), 에틸바닐린, 콩기름, 폴리소르베이트80

[성상] 노랑 내지 겨자색의 점조성 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, E의 보급

- 육체피로 ■ 임신·수유기 ■ 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 ■ 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 각기 - 노의 피로

- 다음 증상의 완화:

신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

- 말초혈행장애 및 갱년기 시idas 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저마·수족냉증(손발이 차가움)

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부
- 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 8) 이 약은 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우(다음 각호의 배합성분별 이상반응을 기재할 것)
- 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 6) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤림부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60캡슐/상자(10캡슐/피티피) X 6, 120캡슐/상자(10캡슐/피티피) X 6 X 2 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

민약, 구입 시 사용(유호)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 문의사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎ 080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의주십시오.

※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

- 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19
- 제조자: (주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61