

건강한 관절을 위한 선택 콘티포르테 정

고함량 콘드로이틴설페이트나트륨 800mg
+ 활성비타민 복합체 + UDCA

【원료약품 및 그 분량】1정 중

· 유효성분	
γ-오리자놀(KP)	5mg
니코틴산아미드(KP)	60mg
콜린타르타르산염(별규)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
이노시톨(KP)	20mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	800mg
피리독신염산염(KP)	25mg
시아노코발라민1000배산(KP)	20mg
(시아노코발라민으로서 20마이크로그램)	
벤포티아민(KP)	30mg
(티아민염산염으로서 21.69밀리그램)	
우로스데옥시콜산(KP)	30mg

· 기타첨가제
라우릴황산나트륨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMB노란색(80W42096), 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리에틸렌글리콜400, 히프로멜로오스

【성상】 황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기, 눈의 피로

【용법·용량】 만 19세 이상의 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
(1) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감
- 변비, 홍반(붉은반점), 두드러기, 습진, 발진, 반진구성발진, 기려움, 부종(부기), 부종 수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

【포장단위】 60정/병, 120정/병(60정/병 x 2), 45정/병, 90정/병(45정/병 x 2), 180정/병(90정/병 x 2), 90정/병, 20정/상자(10정/피티피 x 2)

【사용기한】 외부포장 참조

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조자】 (주)마더스제약 / 전라북도 익산시 삼기면 산단오롱길 38 마더스제약 제2공장

- * 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
- * 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- * 작성일자(2024.01.18) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의 하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- * 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일: 2024년 01월 18일

CTF-2312-00

40년 이상 엄마의 마음으로 여러분의 건강을 지켜온



(주)마더스제약 Since 1974 -
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.