

비플렉스

두업케어.

일반의약품

1일	1회	복용 연령
1회	1정	만 12세 이상

【유효성분】 1정 (950mg) 중

벤조티아민(KP)(아연염산염으로서 72.3mg)	100mg	시아노코발라민(KP)	1mg
푸르실리딘(KP)	30mg	아노시톨(KP)	50mg
리보플라빈(KP)	100mg	콜레스티라메콜을축산염(KP)(비타민 D로서 1000IU)	
니코틴아미드(KP)	10mg	동물유래성분: 알, 알코	70mg
판토틨산칼슘(KP)	100mg	신항아연(KP)(아연으로서 24.1mg)	30mg
피리독신염산염(KP)	100mg	셀레늄함유긴조효소(KP)(셀레늄으로서 6.6μg)	40mg
비오린(USP)	0.1mg	신항비그네슘(KP)(비그네슘으로서 60.3mg)	100mg
폴산(KP)	0.5mg	우르소데옥시콜산(KP)	15mg

【기타 첨가제】 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥타드라이닐글리세르(20F650003), 전분, 글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 경각색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다들 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 뼈의 발달·성장 · 구루병의 예방 · 각기 · 눈의 피로 · 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요추·허리통, 어깨·팔꿈치 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(안안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1회 1일, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 양종질환), 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장(콩팥)결석 환자 5) 심한 중상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 안산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 아기의 치료받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ①비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다. 5) 소화장애, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분)에 나타나는 대장염 등의 위장질환 환자 6) 심장-순환기계기능 장애 환자 7) 신장(콩팥)장애 환자 8) 저단백혈증 환자 9) 감시배당체를 투여 중인 환자

10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 11) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

① 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(안안염), 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심장박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 말초홍시, 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부)팽만, 폐부종(부기) 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 3) 폴산이 부족한 환자(예 비타민 B₆)를 1일 10 mg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다. 7) 항알도스테로이드, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오. 3) 요산(변)을 항적으로 변화시켜서 혈액중에 양분을 줄 수 있습니다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기·적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60정/병, 120정/상자 [(60정/병×2)]

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【최신정보확인방법】 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

- 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

【문의전화】 080-920-2002(고객만족팀)

【부작용 보고 및 피해구제 신청】 1644-6223(한국약물안전관리원), 14-3330(피해구제신청 전용번호)

【제조원】

(유)한중제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주신단6로 301 1~3층, 5층, 봉동로 705

【판매원】

동아제약㈜

서울특별시 중구 동대문로 1번지 10층 1006호

