

멀티블루에프정

일반의약품	조제용
분류번호: 기타의 비타민제	

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(205mg)중

- 유효성분 : 비스벤티아민(KP)···33.33mg(티아민염산염으로서 29.16mg)
피리독신염산염(KP)····· 50mg
시아노코발라민(KP)····· 0.5mg
산화아연(KP)····· 18.67mg(아연으로서 15mg)
아셀레사나트륨오수화물(EP)···0.333mg(셀레늄으로서 100μg)
크롬함유건조조효모(KP)····· 12.5mg(크롬으로서 6.25μg)
황산망간수화물(USP)····· 3.08mg(망간으로서 1mg)
- 첨가제(테르세스) : 정색 2호, 적색 40호
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스(I02), 스티아르산마그네슘, 크로스포비든, 탈질드파란색(2L1341)

【성상】 연한 피란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음경우의 비타민 B₁, B₆의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통요통, 어깨결림 등, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로
- 아연의 보급

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1정 복용 또는 1일 1회, 1회 2정 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 12개월 미만의 영아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 인산염, 칼슘염, 강구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - (2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 소화성궤양, 만성제양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - (4) 신장장애 환자
 - (5) 저단백혈증 환자
 - (6) 당뇨병(췌장)관련 질환, 간질환 환자
 - (7) 당뇨병 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
 - (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - (4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심

부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

- (5) 항일도스테로제, 트리암페렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - (6) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - (7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병

【제조외과사】 ㈜라이프팜텍 서울특별시 구로구 디지털로 272 108호(구로동)

【제조자】 메디스제약㈜ 전라북도 완주군 봉동읍 완주신단6로 170

- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.
- ※ 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참조하시기 바랍니다.
- ※ 이 제품 설명서 작성년월일 이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-801-8570)로 문의하시기거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청을 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에서 할 수 있습니다.
- ※ 육안으로 이물질이 발견될 시 사용하지 마십시오.

작성년월일: 2023년 03월 20일
문서번호: PM970(00)

【제조외과사】



【제조자】

