

타프리드TM정

(테노포비르알라페나미드헤미말산염)

Taflead[®]Tab.

- 원료약품 및 그 분량** **:1정 중**
유효성분: 테노포비르알라페나미드헤미말산염(별규)..... 28.51 mg
(테노포비르알라페나미드로서 25 mg)

첨가제(중물유래성분): 유당수화물(소/우유)
기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아릴푸마르산나트륨, 오파드라이II노란색(85F120028), 콜로이드성아산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨

- 성상** **:노란색의 원형 필름코팅정**

- 효능·효과** **:성인의 만성 B형 간염 치료**

- 용법·용량**
1. 성인 권장 용량
1일 1회 1정을 식사와 관계 없이 투여한다.
2. 신장에 환자 대상 용량 조절
경증, 중등증 또는 중증 신장애 환자에게 이 약의 용량 조절은 필요하지 않다. 만성 혈액투석을 받는 환자의 경우 투석 당일에는 투석 완료 후에 이 약을 복용해야 한다. [사용상의 주의사항]의 '9. 신장애 환자에 대한 투여' 참조.
3. 간장애 환자 대상 용량 조절
간장애 환자에게 이 약의 용량 조절은 필요하지 않다. [사용상의 주의사항]의 '3. 이상반응' 및 '10. 간장애 환자에 대한 투여' 참조.

- 사용상의 주의사항**

- 경고
 - 치료 중단 후 B형 간염의 증증 급성 악화
이 약을 포함한 B형 간염 치료의 중단은 간염의 증증 급성 악화를 초래할 수 있다. 이 약의 치료를 중단한 환자는 치료 중단 후 최소 수개월 간 임상 및 실험실적 추적을 통해 주의 깊게 모니터링 해야 한다. 적절할 경우 B형 간염 치료를 다시 시작할 수 있다.

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
 - 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

- 이상반응
 - 임상시험에서의 이상반응
임상시험은 광범위하고 다양한 조건에서 시행되므로, 약물의 임상시험에서 관찰되는 이상반응 비율을 다른 약물의 임상시험에서 관찰되는 이상반응 비율과 직접적으로 비교할 수 없으며, 실제로 관찰되는 비율을 반영하지 않을 수도 있다.
성인 만성 B형 간염 환자에서의 이상반응
테노포비르 알라페나미드 헤미푸마르산염(TAF)의 안전성 평가는 성인 만성 B형 간염 환자 대상의 두 개의 무작위배정, 이중눈가림, 활성 대조 임상시험(108 및 110)의 대상자 1,298명으로부터 얻은 96주 통합 데이터를 기반으로 한다. 총 866명의 대상자가 TAF를 1일 1회 1정 투여 받았다. 추가적인 안전성 평가는 108 및 110 시험에서 120주 동안 눈가림 치료를 지속한 대상자 및 96주부터 120주까지 공개 라벨 치료를 받은 대상자로부터의 통합 데이터를 기반으로 수행되었다(TAF를 지속한 대상자 361명; 96주에 테노포비르 디스포록실 푸마르산염(TDF)에서 TAF로 전환한 대상자 180명).
96주 분석에서, TAF 투여군 중 10 % 이상에서 보고된 가장 흔한 이상반응(모든 등급)은 두통이었다. 중증도와 무관하게 이상반응으로 인해 TAF 또는 TDF 치료를 중단한 대상자의 비율은 각각 1.5 % 및 0.9 %였다. TAF 치료군에서 5 % 이상 발생 중등 이상반응(모든 등급)의 빈도는 표 1에 요약되어 있다.
<표 1> 시험 108 및 110에서 만성 B형 간염 시험대상자 중 5 % 이상에서 보고된 이상반응(모든 등급)(96주 분석)

테노포비르알라페나미드헤미푸마르산염 (TAF) (N=866)		테노포비르 디스포록실 푸마르산염 (TDF) (N=432)
두통	12 %	10 %
복통 ^c	9 %	6 %
기침	8 %	8 %
요통	6 %	6 %
피로	6 %	5 %
오심	6 %	6 %
관절통	5 %	6 %
설사	5 %	5 %
소화불량	5 %	5 %

- 이상반응 빈도는 시험약과의 상관관계와 무관하게 치료 후 발생한 모든 이상사례를 기반으로 한다.
- 이중눈가림 단계
- 상복부통, 하복부통 및 복부압통을 포함
108 및 110 시험에서 5 % 미만의 대상자에서 발생한 추가적인 이상반응은 구토, 발진 및 위장장애나غم기침을 포함한다.
120주 동안 TAF의 눈가림 치료를 지속한 대상자에서의 TAF의 안전성 프로파일은 96주에서와 유사하다. 120주 동안 공개 라벨 단계로 TAF를 유지한 대상자에서의 TAF의 안전성 프로파일은 96주에 TDF에서 TAF으로 전환한 대상자에서와 유사하다.
신장 실험실검사
기저치인 크레아티닌 청소를 추정치 중간값이 TAF 및 TDF군 각각 106 및 105 mL/min인 성인 만성 B형 간염 환자를 대상으로 한 108 및 110 시험의 통합 분석에서, 96주 시험에 두 치료군 모두에서 평균 혈청크레아티닌이 0.1 mg/dL 미만 증가하였고 혈청 인 중간값이 0.1 mg/dL 감소하였다. 기저치일 대비 96주의 eGFR 중간값 변화는 TAF 치료군에서 -1.2 mL/min, TDF 치료군에서 -4.8 mL/min이었다.
108 및 110 시험에서 96주 이후에 이중눈가림 치료를 유지한 시험대상자에서, 기저치일 대비 120주의 신장 실험실 검사 수치 변화는 96주와 유사하였다. 108 및 110 시험의 공개 라벨 단계에서 96주부터 120주까지 eGFR 변화 중간값은 TAF 유지군에서 -0.6 mL/min, 96주에 TDF에서 TAF으로 전환한 군에서 1.8 mL/min 이었다. TAF 유지군과 TDF에서 TAF으로 전환한 군에서 120주에서의 평균 혈청 크레아티닌 및 혈청 인 수치 중간값은 96주와 유사했다.
TAF 및 TDF 치료군 간의 이러한 신장 실험실 수치 변화의 장기적인 임상적 유의성은 알려져 있지 않다.
골밀도에 미치는 영향
시험 108 및 110의 통합 분석에서 기저치일부터 96주까지 이중에너지X선흡수법(DXA)으로 골밀도(BMD)를 평가한 결과 요구골 BMD 평균변화율은 TDF 사용 시 -2.6 % 대비 TAF 사용 시 -0.7 %였으며, 고관절 BMD 평균변화율은 TDF 사용 시 -2.5 % 대비 TAF 사용 시 -0.3%였다. 5% 이상의 요구골 BMD 감소는 TAF 치료군의 11 % 및 TDF 치료군의 25 %가 경험하였다. 96주에 7 % 이상의 데릭골 정부 BMD 감소는 TAF 치료군의 5 % 및 TDF 치료군의 13 %가 경험하였다.
108 및 110 시험에서 96주 이후에 이중눈가림 치료를 유지한 시험대상자에서 120주에서의 BMD 평균 변화율은 96주와 유사하였다. 공개 라벨 단계에서 96주부터 120주까지의 BMD 평균 변화율은 TAF 유지군에서 요구골 BMD 평균변화율은 0.6 %, 고관절 BMD 평균변화율은 0 %였으며, TDF에서 TAF으로 전환한 군에서 요구골 BMD 평균변화율은 1.7 %, 고관절 BMD 평균변화율은 +0.6 %로 나타났다. 이러한 BMD 변화의 장기적인 임상적 유의성은 알려져 있지 않다.

실험실 매개변수 결과 이상 ^a	테노포비르 알라페나미드 헤미푸마르산염 (TAF) (N=866)	테노포비르 디스포록실 푸마르산염 (TDF) (N=432)
ALT(> 5.0 x ULN)	8 %	10 %
LDL콜레스테롤(공복)(> 190 mg/dL)	6 %	1 %
요당 (≥ 3+)	5 %	2 %
AST(> 5.0 x ULN)	3 %	5 %
크레아티닌 키나아제(≥ 10.0 x ULN)	3 %	3 %
혈청 아밀라아제(> 2.0 x ULN)	3 %	3 %

- ULN= 정상 상한치
a. 이중 눈가림 단계
b. 빈도는 치료 시작 이후에 발생한 실험실 결과 이상을 기반으로 한다.
눈가림 치료에서 ALT 상승(관련 증상을 동반하거나 동반하지 않은, 베이스라인 대비 2배 이상 및 베이스라인 이후 방문에서 2번 연속)의 10 x ULN 이상의 전반적인 발생률은 96주 동안 TAF 치료군(0.6 %) 및 TDF 군(0.9%)에서 비슷했다. 일반적으로 ALT 상승은 빌리루빈 동반 상승과 관련이 없으며, 치료 시작 12주 이내에 발생하였으며, 재발 없이 해결되었다.
120주 분석에서, 공개 라벨 단계에 TAF를 유지한 대상자에서의 실험실 수치 이상 빈도는 96주에 TDF에서 TAF으로 전환한 대상자에서와 유사했다.
아밀라제 및 리파제 상승 및 해장점
108 및 110 시험에서 96주에 TAF으로 치료받은 8명의 대상자가 오심, 요통, 복부압통, 복통 및 복부팽만, 급성성 해장점과 같은 증상을 동반한 3등급 또는 4등급 아밀라제 상승을 경험하였다. 8명 중 2명의 대상자는 아밀라제 및/또는 리파제 상승으로 인해 TAF의 투여를 중단되었으며, 1명은 TAF 재투여 시 이상사례 재발을 경험하였다. TDF 투여군 중에는 증상을 동반하거나 치료를 중단한 사례가 없었다.

96주에서 120주 사이에 공개 라벨로 TAF를 지속하던 대상자 1명에서 추가적으로 아밀라제 상승 및 관련 증상이 나타났으며, TDF에서 전환한 대상자에서는 없었다.

혈청 지질
108 및 110 시험에서 TAF 및 TDF로 치료받은 대상자의 베이스라인 대비 총 콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 트리글리세리드 및 총 콜레스테롤 대비 HDL 비율 변화는 표 3에 제시되어 있다.
<표 3> 지질: 이상성 HBV감염 및대상성 간질환 환자대상 108 및 110 시험에서 지질 지표의 베이스라인 대비 평균 변화(96주 분석)

	테노포비르 알라페나미드 헤미푸마르산염 (TAF) (N=866)		테노포비르 디스포록실 푸마르산염 (TDF) (N=432)
	베이스라인 mg/dL	96주 Change ^a	베이스라인 mg/dL 96주 Change ^a
총 콜레스테롤(공복)	188 [n=835]	-1 [n=742]	193 [n=423] -25 [n=368]
HDL-콜레스테롤(공복)	60 [n=835]	-5 [n=740]	61 [n=423] -12 [n=368]
LDL-콜레스테롤(공복)	116 [n=835]	+7 [n=741]	120 [n=423] -10 [n=368]
트리글리세리드(공복)	102 [n=836]	+13 [n=743]	102 [n=423] -7 [n=368]
총 콜레스테롤 대비 HDL 비율	3 [n=835]	0 [n=740]	193 [n=423] 0 [n=368]

- 베이스라인 대비 변화는 베이스라인 및 96주 수치가 있는 대상자 내에서 베이스라인 대비 변화의 평균이다. 공개 라벨 단계에서, TAF를 지속한 대상자에서의 120주의 지질 지표는 96주와 유사했다. TDF에서 TAF으로 전환한 대상자에서 96주에서 120주 동안 총 콜레스테롤 평균 변화는 23 mg/dL, HDL-콜레스테롤은 5 mg/dL, LDL-콜레스테롤은 16 mg/dL, 트리글리세리드는 30 mg/dL 및 총 콜레스테롤 대비 HDL 비율은 0 mg/dL이었다. 바이러사학적으로 억제된 만성 B형 성인 대상자에서의 이상반응
바이러사학적으로 억제된 성인에서 TAF의 안전성은 무작위배정, 이중눈가림, 활성 대조 시험(4018 시험)에서의 48주 데이터를 기반으로 한다. 이 시험에서 베이스라인에 TDF를 복용하던 대상자는 무작위배정되어 TAF으로 전환(N=243) 또는 TDF 치료를 지속(N=245)하였다. 4018 시험에서 TAF 투여와 함께 관찰된 이상반응은 108 및 110 시험에서와 유사했다.
바이러사학적으로 억제된 성인 대상 4018 시험에서, 48주에 TAF 및 TDF 투여군에서의 신기능, BMD 및 지질 지표의 베이스라인 대비 변화는 108 및 110 시험에서 96주에 관찰된 변화와 유사했다.

- 시판후 경험
아래의 이상반응이 TAF의 시판후 사용에서 확인되었다. 이 반응들은 확실히 않은 크기의 집단에서 자발적으로 보고되었기 때문에 발생 빈도를 정확히 예측하거나 TAF 노출과의 관련성을 평가하는 것이 항상 가능하지는 않다.
- 피부 및 피부조직 질환
- 혈관부종, 두드러기
- 신장 및 신부기질환
- 급성 신부전증, 급성세뇨관괴사, 근위세뇨관병증, 판코니 증후군

- 일반적 주의
 - HBV 및 HIV-1 동시감염 환자에서 HIV-1 내성 발생 위험
HIV-1 내성 발생의 위험 때문에 이 약 단독으로는 HIV-1 감염 치료에 권장되지 않는다. HBV와 HIV-1에 동시감염된 환자에 대한 이 약의 안전성과 유효성은 확립되지 않았다. 이 약 치료를 시작하기 전 모든 HBV 감염 환자에게 HIV 혈청 검사가 제공되어야 하며, 결과가 양성일 경우 HIV-1 동시감염 환자에게 권장되는 적절한 항레트로바이러스제 병용 요법이 사용되어야 한다.
 - 신장애 발생 또는 악화
테노포비르 알라페나미드 함유 제형에서 급성 신부전증, 근위세뇨관병증(PRT), 판코니 증후군을 포함한 신장애의 시판후 사례가 보고되 바 있다. 이들 사례의 대부분이 기존에 보고된 바 있는 신장 이상사례의 원인이 될 수 있는 잠재적 교란인자를 가지고 있었으며, 이러한 인자들로 인해 환자들이 테노포비르 관련 이상사례에 취약했을 수 있다. 신기능 장애가 있으며, 비스테로이드성 소염제를 포함한 신독성 있는 약물을 복용하는 환자가 테노포비르 전구체를 복용하는 경우에는 신장 관련 이상반응이 발생할 위험이 증가된다[‘사용상의 주의사항’의 ‘5. 약물 상호작용’ 참조]. 이 약 치료 시작 전이나 시작 시점 및 치료기간 중에 임상적으로 적절한 스케줄에 따라 모든 환자에서 혈청 크레아티닌, 혈청 인, 크레아티닌 청소를 추정치, 요당 및 요단백이 평가되어야 한다. 신 기능이 임상적으로 유의하게 감소하거나, 판코니 증후군, 근위세뇨관병증(proximal renal tubulopathy)의 증세가 보이는 경우에는 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - 유산증/지방증을 동반한 중증의 간비대증
테노포비르 디스포록실 푸마르산염(TDF), 테노포비르의 다른 전구체를 포함한 뉴클레오시드 유사체를 단독 또는 기타 항레트로바이러스제와 병용하여 사용할 경우에 치명적인 사례를 포함한 유산증 및 지방증을 동반한 중증의 간비대증이 보고되었다. 유산증 또는 뚜렷한 간독성(뚜렷한 아미노기 전이효소(ALT)의 상승이 없이 나타나는 간비대 및 지방증 포함)을 의심할 만한 임상적 또는 실험실적 이상이 나타난 환자에 대해서는 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - 다른 약과의 병용투여
다음 중 하나라도 포함된 약과 이 약의 병용투여는 권장되지 않는다.
- 테노포비르 알라페나미드
- 테노포비르 디스포록실 푸마르산염
- 아데포비르 디피록실

- 내성
임상시험에서의 내성
96주까지 바이러스 돌파(HBV DNA 수치가 69 IU/mL 미만인 전 이후 2회 연속 방문 시 69 IU/mL [400 copies/mL] 이상인 경우 또는 HBV DNA가 최저점 대비 1.0 - log10 이상 증가한 경우)를 경험했거나, 96주 시험 또는 24주 시험이나 그 이후 초치 중단 시점에 HBV DNA가 69 IU/mL 이상인 대상자의 기저치일 및 치료 중 HBV 분리주를 찍어서 유전자형 내성 분석을 수행하였다. 108 및 110 시험에서 TAF를 투여받은 초치로 및 치료 경험에 있는 대상자에 대한 통합 분석에서, 일부 HBV 분리주에서 치료 이후 아미노산 치환이 HBV 역전사효소 도메인에서 다형성 형태로 관찰되었고, TAF에 대한 내성과 관련이 있는 아미노산 치환은 확인되지 않았다(유전자형 및 표현형 분석). 4018 시험에서 TAF를 투여받은 바이러사학적으로 억제된 대상자의 경우, TAF 48주 치료 기간 동안 내성 분석 대상에 해당하는 대상자는 없었다.
테노포비르 알라페나미드의 항바이러스 활성은 HepG2 세포를 이용한 일시적 주입법(Transient transfection assay)으로 뉴클레오시드 역전사효소 억제제 관련 치환을 포함하고 있는 분리주 패널과 비교해 평가하였다. 라미부딘 내성 관련 rtM204V/I (± rtL180M ± rtV173L) 치환 및 엔테카비르 내성 관련 rtL180M 및 rtM204V 발현과 함께 나타난 rtT184G, rtS202G 또는 rtM250V 치환은 2배 이내의 테노포비르 알라페나미드에 대한 감수성 감소를 보였다(분석간 변동성 이내). 아데포비르 내성 관련 rtA181T, rtA181V 또는 rtN236T 단일 치환 발현 HBV 분리주 또한 2배 이내의 EC50 변화를 보였으며, rtA181V + rtN236T 이중 치환 발현 HBV 분리주는 테노포비르 알라페나미드에 대해 감수성이 감소한 것으로 나타났다(3.7배). 이러한 치환의 임상적인 관련성은 알려져 있지 않다.

- 약물 상호작용
 - 이 약에 영향을 줄 수 있는 약물들
이 약은 P-당단백질(P-gp) 및 BCRP의 기질에 해당한다. P-gp 및 BCRP 활성화에 강력한 영향을 미치는 약물은 테노포비르 알라페나미드 흡수에 변화를 줄 수 있다(표 4 참조). P-gp 활성을 유도하는 약물은 테노포비르 알라페나미드 흡수를 감소시킬 것으로 예상되며, 그 결과 테노포비르 알라페나미드의 혈장 농도가 감소되고 이 약의 치료 효과가 손실될 수도 있다. P-gp 및 BCRP를 억제하는 다른 약물과 이 약이 병용투여하면 테노포비르 알라페나미드의 흡수 및 혈장 농도가 높아질 수 있다.
 - 신기능에 영향을 주는 약물
테노포비르는 사구체 여과 및 동능적 세뇨관 분비에 의해 주로 신장을 통해 배설되기 때문에, 신기능을 감소시키거나 동능적 세뇨관 분비에 대해 경증하는 약물과 이 약을 함께 투약하면 테노포비르 및 다른 신장으로 배설되는 약물의 농도를 증가시킬 수 있으며, 이는 이상반응 발생 위험을 증가시킬 수 있다. 반드시 이에 한정되지는 않지만 동능적 세뇨관 분비에 배설되는 몇 가지 예시 약물로는 아시클로버, 시도포비르, 간시크로버, 발라시클로버 및 발간시클로버, 아미노글리코사이드(예: 겐타마이신) 및 고용량 또는 반복 투여된 NSAIDs가 있다[‘사용상의 주의사항’의 ‘4. 일반적 주의’ 참조].
 - 항콜레스테롤 또는 기타 잠재적으로 유익한 상호작용
확립되거나 잠재적으로 임상적 유의성이 있는 약물 상호작용의 목록이 표 4에 제시되어 있다. 기술된 약물 상호작용은 테노포비르 알라페나미드로 수행된 연구를 기반으로하거나 이 약 사용 시 발생할 수 있다고 예상되는 약물 상호작용이다. 잠재적으로 유익한 상호작용이 포함되어 있지만 경위를 포함하는 것은 아니다.
<표 4> 확립된 또는 기타 잠재적으로 유익한 약물 상호작용^a

병용약물 분류: 약물명	농도와의 영향 ^b	임상적 설명
항경련제: 카바마제핀* 옥스카바제핀* 페노바르비탈* 페니토인*	↓ 테노포비르 알라페나미드	카바마제핀 병용투여 시, 테노포비르 알라페나미드 용량을 1일 2정으로 증량해야 한다. 이 약과 옥스카바제핀, 페노바르비탈 또는 페니토인의 병용투여는 권장되지 않는다.
항결핵제: 리파부틴* 리팜핀* 리파면틴*	↓ 테노포비르 알라페나미드	이 약과 리파부틴, 리팜핀 또는 리파펜틴의 병용투여는 권장되지 않는다.
천연물 의약품: 세인트존스워트* (Hypericum perforatum)	↓ 테노포비르 알라페나미드	이 약과 세인트존스워트의 병용투여는 권장되지 않는다.

- 이 표에 기재된 것이 모든 상호작용은 아님
- ↑ = 증가, ↓ = 감소
- 약물 상호작용 연구가 실시되었음을 나타냄
 - * P-gp 유도제

- 이 약과 임상적으로 유익한 상호작용이 없는 약물
TAF에 대하여 수행된 약물 상호작용 연구를 근거로 했을 때, 에티닐에스트라디올, 이트르코나졸, 케토코나졸, 레디파스비르/소포스부비르, 미다졸람, 노르게스티메이트, 세르트랄린, 소포스부비르, 소포스부비르/렐파타스비르 및 소포스부비르/렐파타스비르/복식라프레비르와의 임상적으로 유익한 약물 상호작용은 관찰되지 않았다.

- 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임부
위험성 요약
항레트로바이러스 임신 레지스트리(APR)의 이용 가능한 데이터에 따르면, 미국의 메트로폴리탄 애플랜드 선천성 결손 프로그램(MACDP)에서 미국 기준 모집단의 주요 선천적 결손에 대한 배경 비율 2.7 %와 비교하여 테노포비르 알라페나미드(TAF)의 전반적인 선천성 결손 위험에 유의한 차이가 없음을 보여준다[데이터 참조]. 유산율은 APR에 보고되지 않았다. 미국 일반 모집단에서 임상적으로 추정되는 유산율은 15 - 20 %였다.
동물시험에서는 기간 형성 시기에 렫트 및 토끼에서 각각 하루 권장용량을 복용한 사람에서의 테노포비르 노출과 유사하거나 51배 높게 노출하였을 때 발달 이상이 나타나지 않았다[데이터 참조]. 유즙을 통해 TDF를 TAF의 하루 권장용량에서의 노출 대비 약 12배로 노출하였을 때 부작용은 확인되지 않았다. 동물 생식발생독성시험을 통해 항상 사람에게의 반응을 예측할 수 있는 것은 아니기 때문에 임신 중 이 약은 잠재적 이익이 태아에 대한 잠재적 위험성을 상회하는 경우에만 사용해야 한다.
데이터
사람에서의 자료
APR에서 임신 중 TAF 함유 요법에 노출되어 정상 출산으로 이어진 전향적 보고(임신 초기 중 노출 200건 이상, 임신 초기/후기 중 노출 80건 이상 포함)에 따르면, 선천성 결손의 유병률이 임신 초기 TAF 함유 요법에 노출 시 5.2 % (95 % CI: 2.7 - 8.8 %) 및 임신 초기/후기 노출 시 1.2 % (95 % CI: 0 - 6.5%)였다. APR의 방법론적인 제한점은 MACDP를 외부 대조군으로 사용하는 것을 포함한. MACDP 모집단은 질병 특이적이지 않고, 제한된 지리학 영역의 여성 및 유아가 평가되었으며, 임신 20주 이전에 발생한 출산에의 영향은 포함되지 않았다.
동물시험 자료
렫트와 토끼를 대상으로 수행된 배태자 발달 연구에서 수태능 손상 또는 태아에 대한 유해성이 나타나지 않았다. 테노포비르 알라페나미드는 임신한 렫트에서 25, 100 또는 200 mg/kg/day 용량으로, 토끼에서 10, 30 또는 100 mg/kg/day 용량으로 기간 형성 시기 동안(임신 6 - 17일, 7 - 20일 각각) 경구 투여되었다. 렫트 및 토끼에서 각각 하루 권장용량을 복용한 사람에서의 테노포비르 노출과 대략 유사하거나 51배 높게 노출하였을 때 태아에 이상이 나타나지 않았다. 테노포비르 알라페나미드는 테노포비르로 연속하게 전환되며, 렫트와 토끼에서의 테노포비르 노출은 하루 권장용량을 복용한 사람에서의 테노포비르 노출보다 각각 54배 및 85배 더 높게 나타났다. 테노포비르 알라페나미드가 신속하게 테노포비르로 전환되며 렫트와 마우스에서 TDF 대비 더 낮은 테노포비르 노출이 관찰되므로, 렫트에서의 출산 전후 발달 연구는 TDF에 대해서 실시되었다. 유즙을 통해 600 mg/kg/day 용량까지 투여되었으며, 임신 7일 및 수유 20일에 각각 TAF 하루 권장용량을 복용한 사람에서의 테노포비르 노출 대비 12배 및 18배 높은 테노포비르 노출에서 어떠한 부작용도 관찰되지 않았다.

- 수유
위험성 요약
이 약과 대수치에 사람의 유즙을 통해 분비되는지, 유즙 성분에 영향을 미치는지 또는 수유를 받는 신생아에 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 알려져 있지 않다. 테노포비르는 렫트 및 래서스원숭이에서 TDF 투여 후 유즙으로 분비됨이 확인되었다. 테노포비르 알라페나미드가 동물에서 유즙을 통해 분비되는지는 알려져지 않았다. 모유 수유를 통한 발달성, 건강상의 이점과 함께 이 약에 대한 산모의 임상적 필요성 및 이 약되는 산모의 기저 상태가 수유하는 신생아에게 미치는 모든 잠재적인 부작용을 고려해야 한다.
동물시험 자료
렫트와 원숭이 대상 시험에서 테노포비르가 유즙으로 분비됨이 확인되었다. 렫트에서 TDF를 경구 투여 시(최대 600 mg/kg/day까지) 테노포비르가 유즙으로 분비되었다. 가장 높은 용량을 투여하는 동물에서 수유 11일에 혈청 농도 중간값이 최대 약 24 %까지 확인되었다. 수유 중인 원숭이에 테노포비르를 단회 피하투여(30 mg/kg) 시 유즙으로 분비된 테노포비르는 혈청 농도의 약 4 %, 혈청 노출의 약 20 %에 이르는 노출(AUC)을 나타내었다.

- 소아에 대한 투여**
만 18세 미만의 소아 환자에 대한 이 약의 안전성 및 효과는 확립되지 않았다.
- 고령자에 대한 투여**
65세 이상의 환자에 대해 용량 조절은 필요하지 않다.
- 신장애 환자에 대한 투여**
경증, 중등증 또는 중증 신장애 환자에게 이 약의 용량 조절은 필요하지 않다. 만성 혈액투석을 받는 환자의 경우 투석 당일에는 투석 완료 후에 이 약을 복용해야 한다[‘용법용량’ 참조].
중등증 또는 중증의 신장애 (Cockcroft-Gault 법에 따른 eGFR 15 - 59 mL/min; N=78) 또는 혈액투석을 받는 말기 신질환 (ESRD) (eGFR <15 mL/min) (N=15)이 있는, 다른 항바이러스 요법에 TAF으로 전환한 바이러사학적으로 억제된 환자를 대상으로 한 공개라벨 임상시험(GS-US-320-4035)에서 24주 간 TAF에 대해 서로이 확인된 추가적인 이상반응은 없었다[‘용법용량’ 참조].
- 간장애 환자에 대한투여**
간장애 환자에게 이 약의 용량 조절은 필요하지 않다
중등증 내지 중증의 간장애(N=31)가 있고 다른 항바이러스 요법에서 TAF으로 전환한 바이러사학적으로 억제된 환자를 대상으로 한 공개라벨 임상시험(GS-US-320-4035)에서 24주간 TAF에 대해 서로이 확인된 추가적인 이상반응은 없었다[‘용법용량’ 참조].

- 괴항투여 시의 처치**
괴항투여 시 환자가 독성이 나타나지 시 모니터링 해야 한다. 이 약 괴항투여에 대한 처치는 활력징후 모니터링과 환자의 임상 상태 관찰과 같은 일반적인 보조 치료법으로 이루어진다. 테노포비르는 혈액 투석을 통해 효과적으로 제거된다(약 54% 제거세율).
- 보관 및 취급상의 주의사항**
1 - 30°C에서 병을 밀폐하여 보관한다. 원래의 용기에 보관한다.
- 전문가를 위한 정보**
1. 내약 타프리드정(테노포비르알라페나미드헤미말산염) [삼진제약(주)]과 대조약 베를리디정 (테노포비르알라페나미드헤미푸마르산염 [길리어드사이언스코리아(유)])를 2×4 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 23명의 혈청 테노포비르요법을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUCt, Cmax)를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90 %신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 동등함을 입증하였다.

구분	비교평가항목		참고평가항목		
	AUC _{0-24hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	
대조약	베를리디정 (테노포비르알라페나미드헤미푸마르산염) [길리어드사이언스코리아(유)]	128.982 ± 59.048	253.167 ± 149.549	0.46 (0.17 ~ 1.50)	0.31 ± 0.12
시험약	타프리드정 (테노포비르알라페나미드헤미말산염) [삼진제약(주)]	134.690 ± 64.625	250.559 ± 138.029	0.43 (0.17 ~ 1.50)	0.31 ± 0.13
90 % 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)	log 0.9334 ~ log 1.1601	log 0.8652 ~ log 1.2326	-	-	-
(AUC _t , C _{max} , t _{1/2} ; 평균값 ± 표준편차, T _{max} ; 중앙값(범위), n = 2)					
AUC _t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 * 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90 %신뢰구간					

- 저장방법** **: 기밀용기, 실온(1~30°C)보관**

- 포장단위** **: 30정**

- 제조소** **: 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제막공단1길 52**

- ※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2023년03월23일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약물안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 사용기한(또는 유효기한)이 경과되었거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용기한(또는 유효기한)이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 제품의 사용기한(또는 유효기한)은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.
- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.