

마이칼큐정

【원료약품 및 그 분량】 1정(564.00밀리그램) 중

· 유효성분 :

- 시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘으로서100밀리그램)·····475.00밀리그램
 글리세르포스페이트(분말형)(EP)(비타민D로서1000IU/g) 10.00밀리그램
 시아노코발라민(USP)·····1.00밀리그램
 폴산(EP)·····1.00밀리그램
 · 첨가제(타르색소) : 청색2호 알루미늄레이크
 · 기타 첨가제 : 포비돈, 카르나우바인, 미결정셀룰로오스, 저치호나도
 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스포비
 돈, 스테아르산마그네슘, 말크, 글로이드성이산화규소, 탈폴드노란색
 (11Y824)

【성상】

황갈색의 정방형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다
 - 뼈, 이의 발육발달, 구구병의 예방

【용법·용량】

성인: 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 a) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcomoidosis : 월인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 저맥이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 강심배당체를 투여중인 환자

7) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상시 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈당, 열골달아오름, 심부름불규칙, 피부발진
 - 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 4) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 5) 항알도스테로제, 트리암테네과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 6) 우발적으로 과광복용 한 경우
 - 7) 1개월 정도 복용하더라도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

【포장단위】 30 정/병, 90 정/병

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품의 상세정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부부서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국 의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 피해구제 상담(14-3330), 의약품 부작용 신고·피해구제 상담(1644-6223)

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805(무로전화서비스)

제조·판매자



무로제약주식회사

경기도 화성시 향남읍 제막동 21-26
www.mmpfarm.co.kr

(작성 연월일 : 23. 03. 24)

(M01)