

효과빠른 기침, 가래약 브이코프 에이치 캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(339mg) 중

■유효성분

DL-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
구아이페네신(KP)	50mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	10mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg

■기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 캡슐

【성상】

미황색 내지 백색의 가루가 든 상부 청색 불투명, 하부 미황색 불투명 캡슐

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【효능·효과】

기침, 가래

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성 성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정 조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용) 하지 말 것.

다른 진해(기침을 그치게 함) 거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구(먹는, 복용하는)제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 만 7세 이하의 영·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.
- 3) 복용 시에는 음주하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【사용기간】

제조일로부터 36개월

【포장단위】

10캡슐/PTP

【저장방법】

기밀용기, 실온(1 ~ 30 ℃) 보관

【소비자상담실】

080-811-3011

【판매자】 경보제약



종근당홀딩스

가죽회사

【제조사】



메디스제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 첨부문서 최종 개정연월일(23.04.01)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.
- 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)