



**【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ■ 유효성분 : 아세트아미노펜(KP)  | 200mg  |
| 덱스트로메토르판부하수소산염수화물(KP) | 8mg    |
| 클로르나리딘알라닌염(KP)        | 1.25mg |
| 구아니페딘(KP)             | 40mg   |
| DL-메틸에페드린염산염(KP)      | 6.25mg |
| 슈도에페드린염산염(USP)        | 15mg   |

- 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 적색 40호
- 첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽내피)
- 기타 첨가제 : 폴리비닐피롤리돈400, 포비돈, 프로판글리콜, 농글리세린, 부분탈수유동소르비톨, 정제수

**【성상】** 미황색의 투명한 액인 것. 적색의 투명한 타원형 연질캡슐

**【효능·효과】** 2가지의 제증상(여러 증상)(코막힘, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

**【용법·용량】** 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐, 식후 30분에 복용

**【사용상의 주의사항】**

**1. 경고**

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 과소박열(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었다. 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 두어 후 피부반응이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.
- 4) 슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포(고름 물집)증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름 물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

**2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.**

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감각약 복용 시 전신성 발진성 적인 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(2나이가)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 항파킨슨제) 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 중증(심한 증상) 또는 조절되지 않는 고열인 환자
- 6) 중증(심한 증상) 급성 또는 만성 신장(콩팥)질환/신부전 환자

**3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.**

- 1) 진해(기침을 그치게 함) 거담제(가래약), 다른 감각약, 해열진통제, 진정제, 항산화제(항산화제)를 함유하는 내복약(비임) (코약)을 장구제, 입약, 알레르기약)

**4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과사, 약사와 상의할 것.**

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(2나이가) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
- 2) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통(배 아픔), 직장 출혈 등이 발현(드러날)될 경우
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염(코감), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람

- 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위암(위장암), 녹내장( : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 폐노(소변을 늘)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속 쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나 괴상, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 30주 이후, 살라실산나트륨, 살라실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살라실산알루미늄, 이부프로펜, 중독성피로피사용해(리얼중독성) : 고열을 동반하고, 발진·발적(출혈)이 동반됨), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
- 8) 의사 또는 치과사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람  
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

**5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.**

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타나는 경우  
발진·발적(출혈)이 동반됨, 가려움, 구역 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 폐노(소변을 늘)곤란, 목아름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면, 고음(오른자 대사성 산증(HAGMA))
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타나는 경우  
① 속(아나필락시스)(과민성 쇼크) : 복통 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.  
② 피부적막안중후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성피로피사용해(리얼중독성) : 고열을 동반하고, 발진·발적(출혈)이 동반됨, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.  
③ 천식  
④ 2가지는 : 전신의 나쁜한, 황달(임부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다.  
⑤ 전신성발열 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타남.  
⑥ 가역적 뇌병증 증후군 및 기적적 뇌혈관 수축 증후군 : 갑작스러운 심한 두통, 뺨개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현(드러날)될 수 있다.  
3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

**6. 소아에 대한 투여**

- 1) 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

**7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항**

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용 시에는 음주하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 5) 비로피로피사용해(리얼중독성) : 고열을 동반하고, 발진·발적(출혈)이 동반됨, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
- 6) 아세트아미노펜과 플루클로사살린의 병용(함께 복용(사용))투여에서 피로글루타민 산증으로 인한 고음(오른자 대사성 산증(High anion gap metabolic acidosis, HAGMA))이 보고되었다. 가장 위험도가 높은 환자는 폐활량, 중증(심한 증상)의 신기능 장애, 영양실조 등 기저질환이 있는 환자이고, 이 환자들은 한 가지 또는 두 가지 약물을 모두 중단한 후에 호전되었다. 이 약과 플루클로사살린을 동시에 복용할 경우 주의를 기울여야 하고 HAGMA가 의심되면 이 약 및/또는 플루클로사살린 투여를 중단한다.

**8. 저장상의 주의사항**

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

**【제조단위】** 10캡슐

**【취급상의 주의사항】**

- ※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설처 및 의약품판매업자에게만 비수할 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2025년 12월 23일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약물안전관리센터(14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않습니다.
- ※ 소비자 상담실 (02)661-4011

**【제조(외)사】** (주)에이로젠바이오로직스 / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

**【제조자】** 동방메프티엘(주) / 경기도 화성시 합남면 제약공단4길 78

**【판매자】** (주)대웅생명과학