

일반의약품

조제용

마이속정

[탄산수소나트륨]

1000정

 baskhanbio

【원료약품 및 분량】1정 중

· **유효성분** : 탄산수소나트륨(KP) 500 mg

· **첨가제(동물유래성분)** : 유당(젖당)수화물 (소, 우유)

· **기타첨가제** : 탭크, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히프로멜로오스, 산화티탄, 이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】 1. **주요효능 효과** 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 2) 산증의 개선 2. **다음 질환에도 사용할 수 있다.** 요산배설의 촉진과 통풍발작의 예방

【용법·용량】 성인 : 탄산수소나트륨으로서 1회 0.5~1 g, 1일 3~5 g을 경구투여한다(먹는다, 복용한다). 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】 1. **다음 환자에는 투여하지 말 것.** 1) 나트륨 섭취 제한을 필요로 하는 환자(고나트륨혈증, 부종(부기), 임신중독증, 방광결석, 고혈압환자 등) 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. **다음 환자에는 신중히 투여할 것.** 1) 심한 소화관궤양 환자 2) 신장장애(신장장애) 환자 3) 심기능장애, 폐기능장애 환자 4) 저클로르성알칼리증 등의 전해질실조 환자 3. **부작용** 1) 대사이상 : 알칼리증, 나트륨 축적에 의한 부종(부기) 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약[복용(사용) 중지] 등 적절한 처치를 한다. 2) 소화기계 : 때때로 위부팽만, 트림 드물게 위산의 반동성 분비 등이 나타날 수 있다. 4. **일반적 주의** 1) 울혈성심부전, 부종(부기) 또는 나트륨정체 뿐만 아니라 감뇨증 또는 무뇨증이 있는 환자에는 주의하여 투여한다. 2) 과산증(위산과다증)에 투여할 때에는 식전 공복(빈 속)에 투여하며 탄산가스의 자극을 적게하기 위하여 다른 제산제와 배합하여 투여한다. 3) 완충성이 있으나 장기 투여로 알칼리증(혈뇨, 구토, 출혈, 탈수증)이 일어날 수 있으므로 주의하여 투여한다.

5. **상호작용** 1) 이 약의 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 병용[함께 복용(사용)]약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다. 2) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용[함께 복용(사용)]시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조외곽자】 (주)바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

【제 조 자】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
※ 소비자상담전화 : 031-692-2900
※ 작성일[2023.02.28.(Rev.0)] 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

【제조번호】

【사용기한】

35X18mm



(01)08806562053025

의약품의 정상적인 사용에도 불구하고,
부작용이 발생하는 경우 **부작용 신고 및 피해구제 신청**은
한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.



재활용 어려움