시방서 / Spec.

제품명 Product Name	진센시드 캡슐
구 분 Type-Material	설명서
자재코드 Code No.	GINI-001
바 코 드 Bar Code No.	-
규 격 Size (L X W X H/mm)	160 X 180
소 재 Metrial	모조지 70g
후 가 공 Post Processing	접지 없음
풀 림 Unroll	

색 상 Color

인쇄적용
CMYK 4도
칼선

CMYK 참고용
Pantone2300C
Pantone292C
Pantone2380C

개정사유 Reason for revision	신규
국 가 Country-Company	대한민국
작 성 일 Date	2024. 03. 08

담 당 Manager	
디자인	조혜랑
개발부	이주현
마케팅	문가희
생산부	-
구매부	신한웅
해외사업부	-

비 고 Remarks

Dongkook 동국제약

일반의약품

식약처 승인 인삼성분 의약품

진센시드캡슐

(인삼40%에탄올건조엑스)

GINI-001

[제품명] 진센시드캡슐(인삼40%에탄올건조엑스) **[구분]** 일반의약품

[성 상] 밝은 갈색 분말이 들어있는 오렌지색의 경질캡슐제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(383 mg) 중
- 유효성분 : 인삼 40% 에탄올건조엑스(생규) ····· 100 mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)
- 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐, 함수이산화규소, D-만니톨

[효능·효과]
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 육체적·정신적 피로, 허약, 탈진, 집중력 저하 개선

[용법·용량]
성인 및 만 12세 이상의 소아는 다음 용량을 물과 함께 복용한다.
성인 : 일반적으로 1일 2캡슐을 아침에 복용하거나 1캡슐씩 아침과 점심에 각각 복용한다.
만 12세 이상의 소아 : 일반적으로 1일 1캡슐을 아침에 복용한다.
만 12세 미만의 소아에게는 사용하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 인삼 또는 이 약 구성성분에 대한 과민증이 있는 환자
 2) 만 12세 미만 소아
 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 1) 당뇨병 환자
 2) 항응고제(예: 펜프로쿠몬, 아세노쿠마롤, 와파린)를 복용하고 있는 환자
 3) 수유부

식약처 승인 인삼성분 의약품

진센시드캡슐

(인삼40%에탄올건조엑스)

(병중·병후) 육체·정신피로
허약·탈진 | 집중력 저하

4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것
5) 이 약은 적색40호(알루라레드 AC, Allura Red AC)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 1) 복용(사용) 3개월 후 증상이 완화되지 않는 경우
 2) 이상반응
 때때로 경미하고(가벼운, 대수롭지 않은) 일시적인 위장반응(오심(구역), 위통, 설사) 및 불면증이 보고되었다.
 이 외에도 드물게 알레르기성 피부반응이 관찰되었다.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 1) 당뇨병 환자를 위한 참고사항
 이 약으로 치료를 시작하기 전, 질병의 증상이 치료가 필요한 특정 기저질환에 의한 것은 아닌지 명확히 해야 한다.
 일반적으로 자주 발생하는 현기증은 의사와 상의해야 한다.
 이 약에는 탄수화물이 포함되어 있다. 또한, 인삼은 혈당 수치를 낮출 수도 있으므로 당뇨병 환자는 이 약을 복용하기 전 의사와 상의해야 한다.
 편식, 과도한 지방의 섭취 및 흡연은 동맥경화 부작용을 악화시킬 수 있다.

5. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관할 것

[포장단위] 60캡슐 / 병 **[저장방법]** 기밀용기, 상온(15~25°C) 보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질・변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해드립니다.
※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(www.dkpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※ 제품에 관한 문의사항은 동국제약㈜ 소비자 상담실 (☎080-550-7575)로 문의주십시오.
※ 부작용 보고 및 피해 구제신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

- 제조자: **풍림무약㈜** 경기도 화성시 향남읍 제약공단 3길 120
- 판매자: **동국제약㈜** 충청북도 진천군 광혜원면 사동길 18-1

개정연월일 : 2024.03.07