

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

첨부문서 작성일자 : 2023년 5월 04일

일반의약품
분류번호(03190)
기타의 비타민제

옥체피로와 신경피로 동시 개선 센비백 뉴로업 정

[원료 약품 및 그 분량] 1정(1,175mg) 중

유효성분	
벤포타이민(비타민B ₁) (타이민염산염(오)로서 72.31mg) (KP)	100mg
비스벤티타이민(비타민B ₆) (타이민염산염(오)로서 13.125mg) (KP)	15mg
리보플라빈(비타민B ₂) (KP)	100mg
니코틴아미드(비타민B ₃) (KP)	30mg
판토탄산칼슘(비타민B ₅) (KP)	100mg
피리독신염산염(비타민B ₆) (KP)	100mg
버오티인(비타민B ₁₂) (USP)	0.1mg
폴산(비타민B ₉) (KP)	0.4mg
시아노코발라민(비타민B ₁₂) (시아노코발라민(오)로서 1000μg) (KP)	1.0mg
이노시톨 (KP)	100mg
클린타르타르산염(DAB)	50mg
산화아연(아연(오)로서 32mg) (KP)	40mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄(오)로서 21.6μg) (KP)	40mg
산화마그네슘(마그네슘(오)로서 60mg) (KP)	100mg
농축콜레칼시페롤(본말형)(비타민D ₃) (오)로서 1000IU) (EP)	10mg
우르소데옥시콜산(KP)	30mg

첨가제

■타타 첨제: 미결정셀룰로오스, 저자화도하드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소, 스테아르산마그네슘, 탭탈드노란색(21Y024), 바닐라미크론

[성상] 황갈색의 정방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 (D, B₁, B₂, B₆)의 보급

- 옥체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육발량 - 구루병의 예방 - 각기·노의피로 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1일 1회, 1정 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- (3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자.

- (4) 심장순환기계기능 장애 환자

- (5) 신장장애 환자

- (6) 저단백혈증 환자

- (7) 신장결석 병력이 있는 환자

- (8) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하시기 바랍니다.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.

- (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

- (6) 항알도스테론제, 트리아멘탄과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

- (7) 우발적으로 과량복용 한 경우

- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60정/병, 120정(60정/병 x 2)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8070-1

boryungconsumer.co.kr

BORYUNG
보령컨슈머헬스케어

HANKOOK KORUS
PHARM. CO., LTD.

[판매자] 보령컨슈머헬스케어(주) 서울특별시 중로구 창경궁로 136(원남동, 보령빌딩)

[제조자] 한국코러스(주) 충청북도 제천시 강제로 30