

고함량 활성형 비타민

엠디멀티비타정

육체피로, 체력저하, 눈피로, 신경통
근육통, 관절통, 구내염, 설염, 피부염
아연의 보급, 뼈, 이의 발육불량

[원료약품 및 그 분량] 1정(1,075mg) 중

■ 유효성분

벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 36.2mg)	50mg	아스코르빈산(KP)	100mg
리보플라빈(KP)	20mg	토코페롤아세이트2배산(KP)(비타민 E로서 45 아이.유)	90mg
니코틴아미드(KP)	20mg	푸마르산철(KP)(철로서 25mg)	76mg
파리독신염산염(KP)	50mg	황산망간수화물(USP)(망간으로서 7.5mg)	23mg
셀레늄함유간조효모(KP)(셀레늄으로서 29.7µg)	55mg	메코발라민(KP)	1mg
산화아연(KP)(아연으로서 24.1mg)	30mg	판토텐산칼슘(KP)	35mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 100mg)	165.8mg	클레칼시페롤농축분말(EF)(비타민D로서 500 아이.유)	5mg

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭실드칼색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

갈색의 장방형 필름코팅정

[용법 · 용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[효능 · 효과]

○ 다음 경우의 비타민(D, E, B₁, B₂, B₆, C)의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 발육기
- 노년기

○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요하리)통, 어깨결림 등) 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로

○ 혈 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

○ 아연의 보급

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomatosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 영아
- 혈색소증(혈대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 신장(콩팥)결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다

4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

5) 심장 · 순환기계 기능 장애 환자

6) 신장(콩팥)장애 환자

7) 저단백혈증 환자

8) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자

9) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

11) 임부

12) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 붉은 변, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부 · 위통증, 경련, 열, 혼수, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 에스트로겐을 포함한 경구약(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 파리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 철분이 부족한 환자(예 비타민 B₁₂)를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 우발적으로 과량 복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(예 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.

환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 60정 / 병

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1 ~ 30 ℃) 보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변태 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 첨부문서 최종 개정일(2023.06.01) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.
- 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

[판매처]



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 : www.ilmyang.co.kr

[제조사]



메디스제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주공단6로 170