

위신유 정

[원료약품 및 그 분량] 1정(750밀리그램) 중

유효성분 :	
고목(KP).....	75.0 mg
육계(KP).....	230.0 mg
회향(KP).....	36.0 mg
육두구(KP).....	30.0 mg
정향(KP).....	24.0 mg
진피(KP).....	19.0 mg
응담(KP).....	22.0 mg
(이상 수침건조엑스로서 약 60.0 mg)	
탄산수소나트륨(KP).....	312.50 mg
침강탄산칼슘(KP).....	66.50 mg
탄산마그네슘(KP).....	13.0 mg
합성규산알루미늄(KP).....	136.70 mg
디아스타제·프로테아제·셀룰라제2000 II(KP)	
(전분당화력 250단위 이상, 전분호정화력210단위 이상).....	20.0 mg
기타 첨가제 :	
옥수수전분, 전호화전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르나우바납, 탭실드흰색(19W623), 탭실드녹색(29G1320)	
첨가제(타르색소) : 적색 1호, 적색40호	

[성상] 연녹색의 장방형 필름 코팅정

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법·용량] 성인(15세 이상) : 1회 2정 1일 3회, 식후 30분에 복용(사용)한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 투석요법을 받고 있는 환자
 - 만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 테트라사이클린계 항생제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 신장(콩팥)장애 환자
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
 - 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 나트륨 제한 식이를 하는 사람

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 2정/포, 120포/상자(2정/포*120포)

[제조원] 정우신약(주) - 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60(제조자)
삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(판매자)

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

※ 최종수정일자(2023년 11월 06일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 “의약품 검색”에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원 ☎1644-6223



삼진제약



정우신약(주)