

셀레늄·아연·비타민D 함유 제품

맥셀디정 Maxel-D Tab.

[원료약품 및 그분량] 이 약 1 정 중

- 유효성분 : 아셀렌산나트륨오수화물 (EP) 0.333mg
(셀레늄(으로서) 100μg)
산화아연 (KP) 12.449mg
(아연(으로서) 10mg)
콜레칼시페롤농축분말 (EP) 10.0mg
(비타민D(으로서) 1,000IU)
- 동물유래성분 : 콜레칼시페롤농축분말 중 젤라틴(소가죽)
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스(102), 수크랄로스, 스테아르산마그네슘, 오파도라이민색(03B28796), 크로스포비돈, 포비돈

[성상] 흰색의 양면이 불룩한 원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 D의 보급
 - 임신, 수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 만 12세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘 혈증을 일으킬 수 있다.
- (5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (6) 심장 순환기계기능 장애 환자
- (7) 신장장애 환자
- (8) 저단백혈증 환자
- (9) 신장결석 병력이 있는 환자

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 피부병, 맑은 호흡기 악취, 탈모, 조급증, 구토, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역, 저혈압, 폐부종, 구토
- (2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨 혈증, 우울심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (3) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병, 100정/병, 300정/병

[사용기한] 제조일로부터 36개월

※ 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하신 경우 병·의원, 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최초제정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.mcnultypharma.com) 또는 전화(031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330, karp.drugsafe.or.kr)에 할 수 있습니다.

최초제정일자 : 2023.04.24

MSE-2304-00

 **McNulty**
맥넬티제약

[제조자 맥넬티제약주]

충청남도 천안시 서북구 성환읍 물금3길 46