



활성비타민B 성분 5가지가 함유된 임팩타민시그니처정

임팩타민시그니처정은 필수비타민B 8종(활성형 성분 5가지 포함)에 콜린, 이노시톨, 비타민D, 마그네슘이 보강되어, 육체피로, 눈의피로, 체력저하, 어깨결림 등에 효과적인 고효능 활성비타민입니다.

특장점

1. 활성비타민B 성분 5가지가 함유된 프리미엄 비타민

B₁	벤포티아민 100 mg	B₁	비스벤티아민 30 mg	B₂	리보플라빈 부티레이트 25 mg	B₆	피리독살 포스페이트 10 mg	B₁₂	메코발라민 0.5 mg
----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------

2. 콜린타르타르산염 50 mg, 이노시톨 50 mg 함유

3. 산화마그네슘 100 mg, 산화아연 18.7 mg, 비타민D 1,000 I.U. 함유

효능·효과



육체피로·체력저하

일이 부족 많아져
자도 자도 피로하신 분



눈의피로

컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분



어깨결림

목, 어깨가 뭉치고
결리는 분

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

■ 유효성분

벤포티아민(KP)(티아민염산염(으로서 72.31 mg)	100 mg	토코페롤아세테이트50%(EP)(비타민E(으로서 10 I.U.)	20 mg
판토텐산칼슘(KP)	100 mg	산화아연(KP)(아연(으로서 15 mg)	18.7 mg
산화마그네슘(USP)(마그네슘(으로서 60.3 mg)	100 mg	우르소데옥시콜산(JP)	15 mg
니코틴아미드(KP)	50 mg	농축클레칼시페롤(EP)(비타민D(으로서 1000 I.U.)	10 mg
콜린타르타르산염(별규)	50 mg	피리독살포스페이트수화물(KP)	10 mg
이노시톨(KP)	50 mg	폴산(KP)	0.5 mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄(으로서 25 µg)	46.29 mg	메코발라민(KP)	0.5 mg
비스벤티아민(별규)(티아민염산염(으로서 26.25 mg)	30 mg	비오틴(USP)	0.1 mg
리보플라빈부티레이트(KP)	25 mg	· 동물유래성분: 농축클레칼시페롤(양, 양모)	

· 기타첨가제: 경질무수구산, 규화미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로스나트륨, 탭실도노라색(59Y628), 탭실도클러이(92C069), 탭실도화색(93W145), 히드록시프로필셀룰로오스

효능·효과

1. 다음 경우의 비타민(D, E, B₁, B₂, B₆)의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시 - 발육기 - 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육발량 - 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(오목, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로

3. 아연의 보급

용법·용량 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

성상 미황색 네지 황색의 타원형 필름코팅정

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자분, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자분 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자분 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자분 5) 심한 증상의 신부전 환자분 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자분

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 갑상염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자분 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부. 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자분 6) 심장·순환기계기능 장애 환자분 7) 신장(콩팥)장애 환자분 8) 저단백혈증 환자분 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자분 10) 임부 11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자분 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자분

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부 팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 딸·호흡 시 악화, 말초, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 성리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피리독살을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부종, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 8) 항알도스테론제, 트리아멘텐과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 9) 우발적으로 과량복용 한 경우 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사지에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것. 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자분에게는 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조정한다. 환자분이 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제에 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 30정/병, 60정/병, 120정/상자(60정/병)×2, 180정/병, 500정/병

사용기간 제조일로부터 24개월

※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지나거나 변질, 변태, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비처 분청해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. ※ 부작용보고 및 피해구제신청: 한국약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

제조사: (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14



작성 연월일: 2023. 05. 31

※ 이 첨부서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

H00 2301877