

비코딜에스정

Bicodyl S Tab.

【원료약품 및 그 분량】1정(200밀리그램) 중

- 유효성분 : 비사코딜(KP) 3.5mg
우르소데옥시콜산(JP) 10mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴이즈초록색(93041049), 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

【성상】녹색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내 이상발효, 치질

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인, 1회 1~2정, 1일 2회 아침, 저녁 공복 시(식전 또는 식간)에 복용한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 급성 복부 질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색(창자 막힘) 환자
 - 3) 만 7세 이하의 어린이
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 4) 직장(출혈) 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약을 복용함으로써 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 2) 이 약을 복용함으로써 복부 불쾌감, 경련이 일어날 경우
 - 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
 - 3) 복용 시 정제를 씹지 말 것.
 - 4) 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 뭄 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용(유효)기간】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】300정/병

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품인 경우 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 이 첨부문서 작성일자(2023.07.03) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.intropharm.com)를 통하여 확인하실 수 있습니다.
 ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 의약품을 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
 ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 ※ 부작용 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의 바랍니다.

PIB09 E01

【제조자】(주)인트로바이오파마 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12, 104-2 1동 1층(일부) 및 2층(일부)(보관소)

【판매자】(주)로하스메디 충남 아산시 배방읍 회암로 46번길 45-19