



※ 의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

일반의약품

할성형 종합비타민제

이노라민골드정

Inoramin Gold Tab.

【원료약품 및 분량】 1정(563.5mg) 중

■유효성분 : 푸르선티아민(KP)	50mg
아스코르브산(KP)	70mg
도코폴리아세테이트2배산(KP)(비타민E(α))로서 20IU)	40mg
리보플라빈비타데이트(KP)	2.5mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	2.5mg
히드록소코발라민아세트산염(KP)(히드록소코발라민으로서 5μg)	5.22μg
■동등유사성분 : 유당수화물(스, 우유)	
■기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스폴비온, 보피온, 탈레스클리어(92C569), 탈레스탈칸셀(99R1126)	

【성상】

적색의 타원형 필름코팅정제

【효능 및 효과】

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, E, C의 보급
- 육체피로, 임신 : 수유기, 병중 : 병후(병을 앓은 동안이나 회복 후)의 체력저하자, 노년기
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(통풍, 어깨결림 등)
- 각기
- 노인피로

【용법 · 용량】

성인 1회 1정씩, 1일 2회 복용.

【포장단위】

30정/상자(10정/PTP)x3, 60정/상자(10정/PTP)x6, 100정/상자(10정/PTP)x10, 120정/상자(10정/PTP)x12, 180정/상자(10정/PTP)x18, 300정/상자(10정/PTP)x30

【사용상의 주의사항】

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- (3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2) 이 약을 복용하는 동안 다른 약을 복용하지 말 것.

- (1) 레보도파
- (2) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산노중환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- (5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 땀, 번, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경우 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜 것.
- (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (3) 요를 황색으로 변화케 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- (3) 오염/잘못 사용될 위험을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 자체한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조자】 한국신텍스제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 산단오름길 106

【소비자 상담실】 063-853-8110

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.



한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL

개정일 20240119