

치질 · 정맥순환개선

메디오스 정 600mg(디오스민)

[원료약품 및 그 분량] 1정(945mg) 중

■ 유효성분

디오스민(KP) 600mg

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 콜로이드성이산화규소, 탭실드브홍색(11P178), 탭실드클리어(92C569), 셀크

[성상]

분홍 또는 연분홍의 원형 필름코팅정제

[용법 · 용량]

정맥부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용한다.

치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2~3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용한다.

[효능 · 효과]

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 수유부
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 일부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항.

- 1) 이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
- 2) 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.
- 3) 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 일반적주의.

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.

환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1 ~ 30 ℃) 보관

[사용(유통)기간] 사용기간 : 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10정, 60정

· 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변태 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 '소비자 분쟁해결기준'에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상을 드립니다.

· 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

· 첨부문서 최종 개정연월일(2023.06.01)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.

· 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

· 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

[판매처]



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
 소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
 학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 : www.ilyang.co.kr

[제조자]



메디스제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

첨부문서 작성 연월일 : 2023. 06. 01(Rev.01)