

유산균 함유 복합지사제 폴리아린락토 정

설사 묽은변 토사 체함

일반의약품
10정

Arlico
알리코제약(주)

유산균 함유 복합지사제 폴리아린락토 정

【학술정보문의】080-585-0004

【제 조 자】(주)노보엠헤스케어/경상북도 경산시 하양읍 자석산업4로 16-53

【제조외의자】알리코제약(주) / 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】1정 중

비스무트차질산염(KP)···100mg, 스코폴리아 엑스(KP)··· 5mg,
아크리놀수화물(KP)···10mg, 베르베린염화물수화물(KP)···20mg,
락토바실루스스포게네스균(1.0×10^7 개 이상)(별규)··· 5mg

【성상】노란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법·용량】만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1)임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 산생아 2)만 7세 이하의 어린이 3)이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intoler-ance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 위장진통 · 진경제 ➡

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것
1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고열자, 혈변 환자 또는 장액변이 계속되는 환자 3) 위 · 십이지장궤양 등이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색(4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우)이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 2) 복용 시에는 음식하지 말 것 3) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것 3) 오염(질문 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【첨가제】· 첨가제(타르색소): 황색4호 · 첨가제(동물유래성분): 유당(젖당) 수화물(7만 소 사용부위: 우유) · 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 아산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 말트, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프롤로오스

【포장단위】10 정

【저장방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】유통기한 표시일까지