

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

코엔자임 큐텐+셀레늄 함유 항산화 비타민

베타셀민

연질캡슐



【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중

- | | |
|--|---|
| ■ 유효성분 : 토코페롤아세테이트(KP) ······ 200mg
(비타민 E로서 200IU)
아스코르브산(USP) ······ 500mg
베타-카로틴 현탁액30%(KP) ······ 10mg
(베타-카로틴으로서 3mg) | 유비데카레논(KP) ······ 5mg
산화아연(KP) ······ 17.43mg
(아연으로서 14mg)
셀레늄가루 0.1%(KP) ······ 25mg
(셀레늄으로서 25μg) |
| ■ 첨가제(타르색소) : 청색 1호(브릴리안트블루FCF), 적색 40호 | |
| ■ 첨가제(동물유래) : 숙신산젤라틴(기원동물 : 소, 기원부위 : 가죽내피) | |
| ■ 기타 첨가제 : 콩기름, 레시틴, 백납, 농글리세린, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 산화티탄 | |

【성상】

적갈색의 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 A, C, E의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
 - 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

○ 아연의 보급

【용법·용량】

성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것.(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요 중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정

일반의약품

KGMP 적격업체

2305-00

된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

- 5) 심장순환기계 기능 장애 환자

- 6) 신장(콩팥)장애 환자

- 7) 저단백혈증 환자

- 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 설사, 변비, 위부불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 땀·호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 저혈압, 폐부종(부기)

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

- 5) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

- 6) 장기간 고용량의 비타민 A(베타-카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있다.

- 7) 항알도스테론제, 트리암데렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

- 8) 우발적으로 과량 복용한 경우

- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

- 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.

- 3) 각종 요 검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.

- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

60캡슐, 120캡슐

【취급상의 주의사항】

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 개정일자(2023년 05월 25일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

【제조·의뢰자】

(주)에이프론펜바이오로지스 / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

【제조사】

(주)서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【판매자】

(주)대웅생명과학