

육체·신경피로이중효와 비타민

파워비큐

액티브정



일 반 의 약 품

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【제품명】 파워비큐액티브정

【원료약품 및 그 분량】 1정(880mg) 중

• 유효성분 : 아스코르브산(K)	100mg
신화미그네슘(K)	82.9mg
니코틴아미드(K)	50mg
리보플라빈(K)	50mg
벤포티아민(K)	50mg
아노티들(K)	50mg
판토탄산칼슘(K)	50mg
푸르실타이민(K)	50mg
피리독신염산염(K)	50mg
토코페롤이세테이트 2배산	40mg
우르소데옥시콜산(K)	20mg
감마오리자놀(K)	10mg
농축콜레카피롤(K)	10mg
시아노코발라민(K)	0.5mg
비오틴(KF)	0.1mg
폴산(KF)	0.1mg

• 첨가제 : 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유) • 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산 마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드분홍색XP735, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】 연한 분홍색의 타원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E 의 보급
- 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요허리통, 어깨결림 등), 구강염(입피로염), 구순염(입술염), 구내염(입 안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기, 눈의피로

【용법 · 용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12 개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락

토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토 오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 7) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 8) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 3) 고옥살산노증 환자(hyp oxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) 4) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미 숙아, 유아 5) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 6) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 강심배당체를 투여 중인 환자 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 10) 신장결석 병력이 있는 환자 11) 입부 12) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방 대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 침 부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 구내염(입안염), 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(신장부동정지), 중추신경 계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자(가) 비타 민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말 초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자(가) 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyp erursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 장기투여에 의해 고칼슘 혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 10) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 11) 우발적으로 과량복용 한 경우 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 2) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(가) 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다 른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지 질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀 폐하여) 보관할 것. 3) 오염(질뿔 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 120정/상자(60정/박스)

【제조자】 (주)노바엠헬스케어 경성북도 경산시 하양읍 자석산업4로 16-53

【제조(외)지】 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

【소비자상담전화】 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

- ※ 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
- ※ 사용기간이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하기 바랍니다.
- ※ 만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 「소비자분쟁해결기준」에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://medrug.mfds.go.kr>」 → 의약품 등 검색, 을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약학품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있다. 부작용 보고 및 피해구 제 신청 : 한국약학품안전관리원(1644-6223)