

찌릿하고 화끈거리는 통증에

메코이에프정

MecoEF Tablet

일반의약품



신경통



수족저림
수족냉증



근육통



어깨결림

본 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 메코발라민(KP) 1.00mg
푸르셀티아민염산염(푸르셀티아민으로서 50mg)(KP) 54.60mg
피리독신염산염(KP) 49.80mg
폴산(EP) 0.40mg
토코페롤아세테이트2배산(비타민E로서 100I.U)(KP) 200.00mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)

- 기타첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 마결정셀룰로오스, D-소르비톨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이한색 OY-C 7000A, 오파드라이 AMB 2 빨간색 88A650047, 콜로이드 성아산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨

[성상] 갈색의 정방형 필름코팅정

[효능·효과]

■ 다음경우의 비타민 E, B1, B6의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 노인피로

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인 : 1일1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- (3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 레보도파
- (2) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구 내염(임안염)
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 100정/상자(50정/병X2), 120정/상자(60정/병X2)

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 '품목별 소비자 분쟁 해결기준'에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-2305-00

첨부문서 최초 작성년월일 2023. 05. 16

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.com) 및 식품의약품안전처 홈페이지 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)의 해당 제품 정보란에서 확인할 수 있습니다.



동성제약주식회사

[공정] 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

[소비자 상담전화] 080-001-0921

www.dongsung-pharm.com