



※ 약품을 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 약품통과 함께 보관하세요.

일반의약품

이부프로펜 400mg 함유

이프펜정



【원료약품 및 분량】 1정(670mg) 중

■ 유효성분 : 이부프로펜(KP) 400mg

카페인무수물(KP) 50mg

■ 기타첨가제 : 경질주사구산, 라우릴황산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 탄산수소나트륨, 벌크, 포보론

【성상】

하얀색의 장방형 나침

【효능 및 효과】

1) 두통, 치통, 발치후 동통(통증), 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결절), 타박통, 골절통, 열저작(병중독), 월경통(상리통), 외상성의 진통

2) 오한, 발열시의 해열

【용법 · 용량】

· 만 15세 이상 및 성인 : 1일 1-3회, 1회 1정

· 공복(빈 속)을 피하여 복용한다.

· 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【포장단위】

10정/PTP, 100정/병

【사용상의 주의사항】

1. 경고
· 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사와 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병역이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 열이 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 병통의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 기려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 돌이 약한 사람 또는 고혈압이 있는 사람
- 5) 고령자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사가 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 9) 구두와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람

5. 다음과 같은 경우는 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상등 시 가능한 한 침묵부서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진, 발적, 가려움, 구역 구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화불량, 위부불쾌감, 어지러움, 부종
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 속(나팔막)에 : 복통후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부점막안종후군(스티븐스-존슨후군), 중독성표피괴사증(리델후군) : 고열을 동반하고, 발진, 발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
③ 천식
- 3) 5 ~ 6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장해진 용법 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 자세한 사항은 식품의약품안전처 약품품질정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【제조자】 한국신택스제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 산단오로길 106

【소비자 상담실】 063-853-8110

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다.
만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
※ 약품의 사용 후 부작용 발생시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물관리안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.



한국신택스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL

개정일 20230901