



※ 의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

일반의약품

파라브롬 50mg 함유 이프펜더블유정



【원료약품 및 분량】 1정(670mg) 중

- 유효성분 : 이부프로펜(KP) 400mg
파라브롬(KP) 50mg
- 기타첨가제 : 경질수구산, 카우릴황산나트륨, 크로스카멜로스나트륨, 탄산수소나트륨, 탈코, 포비돈

【성상】

하얀색의 장방형 나정

【효능 및 효과】

- 1) 두통, 치통, 발치후 통증(통증), 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결절), 타박통, 골절통, 열차통(범종증), 월경통(생리통), 외상성의 진통
- 2) 오한, 발열시의 해열

【용법·용량】

- 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1정
- 공복(빈 속)을 피하여 복용한다.
- 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【포장단위】

10정/PTP, 100정/병

【사용상의 주의사항】

1. **경고**
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용하여 할 경우 반드시 의사와 의사와 상담하여야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병역이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용시 전신적 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다. 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장질환, 간성신질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 5) 고령자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나, 배양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 9) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 침묵부서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진, 발적, 가려움, 구역 구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화불량, 위부불쾌감, 어지러움, 부종
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스) : 복통후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부점막만성국소스티븐스-존슨증후군, 중증표피괴사증후군(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진, 발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 - ③ 천식
 - ④ 5 ~ 6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
 - 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
- ## 8. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오용을 하고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【제조자】 한국신텍스제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 산단오름길 106

【소비자 상담실】 063-853-8110

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질지표기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물안전관리센터(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.



한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL



개장일 20230613