

관절엔- 파워조인에스 600정



【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분

콘드로이틴설페이트나트륨(KP) (동물유래성분:소,연골).....	600mg
감마-오리자놀(KP)	5mg
푸르셀타민(KP)	50mg
니코틴아미드(KP)	45mg
아노시톨(KP)	25mg
폴리타르타르산염(불규)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	20mg
시아노코발라민1000배산(KP) (시아노코발라민(오)로서 10μg)	10mg
피리독신염산염(KP)	10mg
리보플라빈(KP)	6mg
농축콜레칼시페롤(Ep) (비타민 D(오)로서 50 I.U.)	0.5mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당(젓당)수화물(소,우유)

■ 기타첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 히프록셀로오스, 탈레스 갈색 91B749

【성상】 갈색의 정방형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민B₁(푸르셀타민)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기, 눈의 피로

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 3개월 미만의 젓먹이 4) 산장갈색 환자 5) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젓먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 5) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 증상이 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 증상이 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 변비, 식욕부진, 흉만(붉은 반점), 두드러기, 습

진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기)·수분저류(신부전 또는 심부전 환자) 2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 4) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 5) 우발적으로 과량복용한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기법】 직접용기에 별도포기

【포장단위】 45정/병

- 본 약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ks))나 제품상담 전용전화를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 약품들을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '약품공동항정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.
- 약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원에 할 수 있습니다. **신청방법** ☎ 1644-6223, 14-3330 / c karp.drugsafe.or.kr **신청대상** 약품부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족 **보상범위** 사망일시보상금, 장애비, 장애일시보상금, 진료비

※ 2023. 6. 7 작성
(Ver.002)

【제조/제자】



에스케이케미칼(주)
충청북도 청주시 흥덕구 신선로 149

【제조사】

NOVA M³
Healthcare
(주)노바엠헬스케어
충청북도 청주시 하양읍 자식산4로 16-53

자세한 문의를 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무로): 080-021-3131