



CHONMAXTM Tab.

- 원료약품 및 그 분량 : 1정 중
유효성분: 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)(동물유래성분(소/연골))...800 mg
벤토티아민(KP)(티아민염산염으로서 43.38 mg).....60 mg
니코틴산아미드(KP).....60 mg
피리독신염산염(KP).....25 mg
판토텐산칼슘(KP).....15 mg
리보플라빈(KP).....6 mg
농축콜레칼시페롤 산(EP)(비타민D3로서 1,000 IU).....10 mg
메코발라민(KP).....1 mg
이노시톨(KP).....20 mg
산화아연(KP)(아연으로서 24 mg).....30 mg
감마-오리자놀(KP).....5 mg
첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭틸드칼셉(99B703)

- 성상
적갈색의 장방형 필름코팅정

- 효능·효과
○ 다음 경우의 비타민D, B₁, B₂, B₆의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 발육기
- 노년기
○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로
○ 아연의 보급

- 용법·용량
만 19세 이상 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용

- 사용상의 주의사항
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(saroidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
3) 만 12개월 미만의 젖먹이
4) 신장결석 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파
- 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
3) 심장·순환기계기능 장애 환자
4) 신장장애 환자
5) 저단백혈증 환자
6) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
: 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부 팽만감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 변비, 홍반, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종·수분 저류(신부전 또는 심부전 환자)
2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
4) 고혈당 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperurisemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
6) 할랄도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
7) 우발적으로 과량복용 한 경우
8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

- 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- 포장단위 : 30정, 60정
- 제조원 : 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(제조의뢰자)
성이바이오(주) - 강원특별자치도 원주시 지정면 지래로로 184 1층 일부, 3층(제조사)

- ※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2023년 07월 31일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국 의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.
- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.