

육체피로와 신경통을 한번에!

코비메타비정

【원료약품 및 그 분량】 1정 (887mg) 중

■ 유효성분

· 벤포티아민(KP) 100mg	· 피리독살포스페이트수화물(KP) 5mg
(티아민염산염으로서 72.31mg)	· 우르소데옥시콜산(KP) 10mg
· 산화마그네슘(KP) 30mg	· 아스코르브산(KP) 100mg
(마그네슘으로서 18mg)	· 폴산(KP) 0.5mg
· 토크페롤아세테이트 2배산(KP) 40mg	· d-비오틴(USF) 0.5mg
(비타민D로서 20 IU)	· 메코발라민(KP) 1000μg
· 산화아연(KP) 20mg	· 이노시톨(KP) 30mg
(아연으로서 18mg)	· 니코틴아미드(KP) 100mg
· 콜레칼시페롤농축분말(EF) 10mg	· 판토텐산칼슘(KP) 100mg
(비타민D로서 1,000 IU)	· 감마-오리자놀(KP) 5mg
· 리보플라빈부티레이트(KP) 12mg	· 유비데카레논(KP) 5mg
· 셀레늄함유건조효모(KP) 25mg	
(셀레늄으로서 13.5μg)	

■ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 톱실드갈색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【용법 · 용량】 만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₆, B₁₂, C의 보급

— 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 발육기, 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민인 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

— 뼈, 이의 발육불량

— 구루병의 예방

— 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨 결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

— 각기

— 눈의 피로

3. 아연의 보급

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장(콩팥)질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장(콩팥)결석 환자

5) 심한 증상의 신부전 환자

6) 대두유에 과민하거나 일레르기 병력이 있는 환자

7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 안산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

5) 심장 · 순환 기계기능 장애 환자

일반의약품

6) 신장(콩팥)장애 환자

7) 저단백혈증 환자

8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

10) 임부

11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈혈증 및 해장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀, 호흡시 악취, 탈모, 조금증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

10) 우발적으로 과량복용 한 경우

11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것

3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

4) 요를 황색(노란색)으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전, 후에는 피할 것.

6. 일반적 주의

1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.

환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1 ~ 30 ℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

· 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 약약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

· 약약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 약약품과 함께 보관하십시오.

· 첨부문서 최종 개정연월일(2023.08.01)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 약약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.

· 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

· 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

【판매처】



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

【제조자】



메딕스제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170