



치질이 시작되면

# 치킬정

600mg(디오스민)



## [원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 디오스민(KP)..... 600mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 오파드라이QX분홍색(321A640008), 오파드라이투명색(EZ254U590005), 콜로이드성이산화규소, 톨크

[성상] 분홍 또는 연분홍의 타원형 필름코팅정제(앞 : TG 뒤 : DOS)

## [효능·효과]

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

## [용법·용량]

- 정맥 부전 : 디오스민으로서 1회 600mg(1정) 1일 1회 식사 시 복용한다.
- 치질 : 디오스민으로서 1회 600mg(1정) 1일 2~3회 (1,200~1,800mg)(2정~3정) 식사 시 복용한다.

## [사용상의 주의사항]

### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 수유부

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)

### 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것

이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.

### 4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
- 2) 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.
- 3) 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

### 5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/상자(10정/피티피x3), 60정/상자((10정/피티피x3)x2),  
30정/상자(30정/병), 60정/상자(30정/병x2)

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 및 QR코드를 참조하십시오.

**의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물안전관리원에 할 수 있습니다.**

**신청방법** ☎ 1644-6223, 14-3330 | ☐ [karp.drugsafe.or.kr](http://karp.drugsafe.or.kr)

**신청대상** 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

**보상범위** 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

첨부문서 작성 연월일 : 2023. 08. 03

제조·판매자



경기도 화성시 함남읍 제약공단3길 123

☎ 소비자상담전화 080-300-8282